

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos voor 50 ml en 100 ml fles****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Covexin 10 suspensie voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Per ml vaccin:

<i>C. perfringens</i> type A toxoïd	≥ 0,9 U
<i>C. perfringens</i> type B & C (β) toxoïd	≥ 12,4 U
<i>C. perfringens</i> type D (□) toxoïd	≥ 5,1 U
<i>C. chauvoei</i> geïnactiveerde cultuur	conform Ph.Eur.
<i>C. novyi</i> toxoïd	≥ 1,2 U
<i>C. septicum</i> toxoïd	≥ 3,6 U
<i>C. tetani</i> toxoïd	≥ 2,5 U
<i>C. sordellii</i> toxoïd	≥ 0,8 U
<i>C. haemolyticum</i> toxoïd	≥ 16,5 U

3. VERPAKKINGSGROOTTE

50 ml

100 ml**4. DOELDIERSOORT(EN)**

Schaap en rund.

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Subcutaan gebruik.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd: nul dagen

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj }

Na aanbreken gebruiken binnen 8 uur.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Gekoeld bewaren en transporteren.
Niet in de vriezer bewaren.
Bewaar de fles in de buitenverpakking.
Beschermen tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zoetis Belgium

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V265894

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Fles 100 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Covexin 10 suspensie voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Per ml vaccin:

<i>C. perfringens</i> type A toxoïd	≥ 0,9 U
<i>C. perfringens</i> type B & C (β) toxoïd	≥ 12,4 U
<i>C. perfringens</i> type D (□) toxoïd	≥ 5,1 U
<i>C. chauvoei</i> geïnactiveerde cultuur	conform Ph.Eur.
<i>C. novyi</i> toxoïd	≥ 1,2 U
<i>C. septicum</i> toxoïd	≥ 3,6 U
<i>C. tetani</i> toxoïd	≥ 2,5 U
<i>C. sordellii</i> toxoïd	≥ 0,8 U
<i>C. haemolyticum</i> toxoïd	≥ 16,5 U

100 ml

3. DOELDIERSOORT(EN)

Schaap en rund.

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutaan gebruik.
Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd: nul dagen

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}
Na aanbreken gebruiken binnen 8 uur.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Gekoeld bewaren en transporteren.
Niet in de vriezer bewaren.
Bewaar de fles in de buitenverpakking.
Beschermen tegen licht.

**8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN**

Zoetis Belgium

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Fles 50 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Covexin 10

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

C. perfringens type A toxoïd
C. perfringens type B & C (β) toxoïd
C. perfringens type D (□) toxoïd
C. chauvoei geïnactiveerde cultuur
C. novyi toxoïd
C. septicum toxoïd
C. tetani toxoïd
C. sordellii toxoïd
C. haemolyticum toxoïd

50 ml

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 8 uur.