

NAVODILO ZA UPORABO

Cefa-cure 50 mg tablete za pse in mačke

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

INTERVET International B.V.
Wim de Korverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nizozemska

Izdellovalec, odgovoren za sprostitve serije:

Intervet Productions S.r.l., Aprilia
Via NETTUNENSE, Km 20.3
04011 Aprilia (LT)
Italija

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Cefa-cure 50 mg tablete za pse in mačke
cefadroksil

3. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SESTAVIN

1 tableta vsebuje 50 mg cefadroksila.

4. INDIKACIJE

Cefa-cure je indiciran za zdravljenje naslednjih obolenj psov in mačk:

- *piodermija – površinska in globinska* – ki jo povzročajo občutljivi mikroorganizmi, na primer stafilokoki;
- *okužbe mehkih tkiv* (rane, abscesi, vroča mesta ali poletne rane), ki jih povzročajo občutljivi mikroorganizmi, na primer stafilokoki ali streptokoki;
- *okužbe sečil*, ki jih povzročajo občutljivi mikroorganizmi, na primer stafilokoki, streptokoki, *Proteus* spp., *E. coli* ali *Klebsiella* spp.;
- *okužbe dihal*, ki jih povzročajo občutljivi mikroorganizmi, na primer stafilokoki, streptokoki, *Pasteurella* spp. ali *Klebsiella* spp..

5. KONTRAINDIKACIJE

Znana preobčutljivost za peniciline ali cefalosporine.

6. NEŽELENI UČINKI

Driska, mehko blato in bruhanje. Neželeni učinki so redki, blagi in prehodni.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Pes in mačka.

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POT IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Odmerek po 20 mg cefadroksila na kilogram telesne mase 1-krat na dan peroralno. Priporočamo dajanje zdravila med obrokom ali po njem.

Trajanje zdravljenja je odvisno od vrste in resnosti okužbe ter odziva na zdravljenje. Večinoma zadošča 10-dnevno zdravljenje. Če je potrebno in glede na klinični odziv lahko zdravljenje nadaljujemo, dokler menimo, da je odziv nanj ustrezen. Ko bolezenski simptomi minejo, živali zdravimo še najmanj 2 do 3 dni.

Piodermija se večinoma pojavi kot sekundarna okužba ob osnovni bolezni. Priporočljivo je odkriti njen vzrok in žival ustrezno zdraviti.

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Za zagotovitev ustreznega odmerka in da se prepreči premajhno odmerjanje zdravila je treba čim bolj natančno določiti telesno težo.

10. KARENCA

Ni smiselno.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Za shranjevanje ni posebnih navodil.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na škatli poleg oznake EXP.

12. POSEBNA OPOZORILA

Beta-laktamski antibiotiki lahko povzročijo preobčutljivost (alergijo) ob injiciranju, inhalaciji, zaužitju ali ob stiku s kožo.

1. Ne rokujte z zdravilom, če ste senzibilizirani za beta-laktamske antibiotike ali so vam svetovali, da ne delate s takimi preparati.

2. Z zdravilom rokujte z veliko mero previdnosti, da se izognete morebitnemu stiku zdravila s kožo.

3. Če se pri vas pojavijo simptomi izpostavljenosti zdravilu kot so izpuščaj se je treba posvetovati z zdravnikom in pokazati zdravniku to opozorilo. Oteklina obraza, ustnic ali oči ali težave z dihanjem so resnejši simptomi in zahtevajo zdravniško oskrbo.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Ne odvrzite zdravila v odpadno vodo ali v gospodinjske odpadke.

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITEV NAVODILA ZA UPORABO

9.4.2015