

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel für 10 Beutel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Panacur 222 mg/g Granulat zum Eingeben für Rinder und Pferde

2. WIRKSTOFF(E)

Jedes Gramm enthält: 222,22 mg Fenbendazol.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 Beutel mit je 10 g Granulat

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Pferd

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben über das Futter.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder:

Essbare Gewebe: 10 Tage

Milch: 5 Tage (120 Stunden)

Pferde:

Essbare Gewebe: 20 Tage

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Intervet GesmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z. Nr.: 16.255

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

Beutel mit 10 g Granulat

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Panacur 222 mg/g Granulat zum Eingeben

2. WIRKSTOFF(E)

Jedes Gramm enthält: 222,22 mg Fenbendazol.

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Pferd

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder:

Essbare Gewebe: 10 Tage

Milch: 5 Tage (120 Stunden)

Pferde:

Essbare Gewebe: 20 Tage

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Intervet GesmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}