

PRILOGA III

OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**Škatla****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

MARBOCYL 100 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče

2. NAVEDBA UČINKOVINE

1 ml raztopine za injiciranje vsebuje:

marboflokscin 100 mg

dinatrijev edetat 0,1 mg

tioglicerol 1,0 mg

metakrezol 2,0 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje.

4. VELIKOST PAKIRANJA

1 x 50 ml

1 x 100 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči

6. INDIKACIJE**7. NAČIN IN POTI UPORABE**

s.c., i.m.in i.v. dajanje.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:

Meso in organi goveda: 6 dni

Mleko: 36 ur (3 molže)

Meso in organi prašičev: 4 dni

9. POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP{ mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.

Vsebnik shranjujte v zunanji ovojnini, da ga zaščitite pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO
--

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM
--

VETOQUINOL S.A., Magny Vernois – B.P. 189, 70204 Lure, Francija

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

NP/V/0197/001

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serijska številka {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**Viala 50 ml, 100 ml****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

MARBOCYL 100 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče

2. NAVEDBA UČINKOVINE

1 ml raztopine za injiciranje vsebuje:

marbofloksacin 100 mg

dinatrijev edetat 0,1 mg

tioglicerol 1,0 mg

metakrezol 2,0 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje.

4. VELIKOST PAKIRANJA

50 ml

100 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči

6. INDIKACIJE**7. NAČIN IN POTI UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:

Meso in organi goveda: 6 dni

Mleko: 36 ur (3 molže)

Meso in organi prašičev: 4 dni

9. POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP{ mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.

Vsebnik shranjujte v zunanji ovojnini, da ga zaščitite pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

VETOQUINOL S.A., Magny Vernois – B.P. 189, 70204 Lure, Francija

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0197/001

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številk}