

# SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

## 1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

**Bob Martin Permethrin Dog Spot On 744 mg roztok na kvapkanie na kožu –spot on**

## 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna tuba zodpovedajúca jednej dávke obsahuje:

Účinná látka:

Permethrinum (*cis* : *trans* = 25 : 75) 744 mg

Pomocné látky:

Dietylglykolmonoetyléter ad 1 ml

Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.

## 3. LIEKOVÁ FORMA

Roztok na nakvapkanie na kožu – spot on.

Číry, bledý jantárový roztok.

## 4. KLINICKÉ ÚDAJE

### 4.1. Cieľový druh

Psy

### 4.2 Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Zamorenie parazitmi citlivými na permethrin:

Eliminácia blch (*Ctenocephalides felis*) a kliešťom (*Ixodes ricinus* a *Rhipicephalus sanguineus*).

Prevenia proti zamoreniu blchami (*Ctenocephalides felis*) na 4 týždne.

Liek má 4 týždne pretrvávajúci akaricídny účinok proti invázii kliešťom (*Ixodes ricinus* a *Rhipicephalus sanguineus*).

### 4.3 Kontraindikácie

Nepoužívať u šteniat do veku 3 mesiacov.

Nepoužívať u šteniat a psoch do živej hmotnosti pod 2 kg.

Bezpečnosť lieku počas gravidity a laktácie nebola stanovená. Použitie u gravidných a laktujúcich súk nie je odporúčané. (pozri bod 4.7)

Nepodávať psom so známou hypersenzitivitou na ktorúkoľvek zložku lieku.

Nepoužívať u chorých psov alebo u psov v rekonvalescencii alebo v prípade prítomnosti kožných lézií.

**NEPOUŽÍVAŤ U MAČIEK.** Tento liek je extrémne toxický pre mačky a môže spôsobiť úhyn. Na ochranu mačiek pred náhodnou expozíciou je potrebné 72 hodín po ošetrení psa zvieratá držať oddelene. Je veľmi dôležité sa uistiť, že nemôže dôjsť k obtieraniu sa mačky o psa v mieste aplikácie lieku. V prípade náhodnej expozície mačky je potrebné vyhľadať veterinárneho lekára.

### 4.4 Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh

Pri prvej aplikácii zvieratú sa v mieste aplikácie prechodne môže objaviť mierne mastný flak, u zvierat so svetlou srst'ou s nádychom žltej farby.

Ak sa u ošetrovaných zvierat prejavia alebo pretrvávajú príznaky intoxikácie, je potrebné vyhľadať veterinárneho lekára.

#### **4.5 Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie**

##### **Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie pri zvieratách**

Vyhýbať sa častému plávaniu alebo šampónovaniu zvierat'a, môže to znížiť účinnosť lieku.

Ak je v domácnosti viac psov, musia byť ošetrené všetky naraz. Mačky v rovnakej domácnosti musia byť ošetrené iným liekom určeným pre mačky.

Blchy domácich zvierat sa často dostávajú do košov, ležovísk a do miest pravidelného odpočinku, ako sú koberce a súčasti zariadenia. Preto sa musia tieto miesta pravidelne ošetrovať insekticídnym liekom a pravidelne vysávať.

##### **Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám**

Po manipulácii s liekom si umyť ruky vodou a mydlom.

Vyhýbať sa priamemu kontaktu lieku s rukami. Zasiahnuté miesto okamžite opláchnuť.

Predchádzať kontaktu s očami. V prípade zasiahnutia očí okamžite vypláchnuť zasiahnuté oko prúdom čistej vody.

Odporúča sa používať ochranné rukavice počas ošetrovania zvierat liekom.

Osoby aplikujúce liek väčšiemu množstvu zvierat by mali používať ochranné gumové alebo latexové rukavice s minimálnou hrúbkou 0,3 mm.

Ošetrené zvieratá by nemali byť v blízkosti otvoreného ohňa, kým liek na nich neuschne.

Nefajčiť počas aplikácie lieku zvierat'u.

Nedotýkať sa ošetrovaného miesta 3 – 6 hodín po aplikácii.

Ľudia so známou precitlivosťou na pyretroidy by sa mali vyhýbať aplikácii tohto veterinárneho lieku.

U osôb podávajúcich liek zvieratám môže permetrín spôsobiť kožnú parestéziu (zncitlivenie) počas 1 – 2 hodín.

V prípade náhodného užitia vyhľadať lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľov alebo etiketu lekárovi. V prípade pretrvávajúceho svrbenia pokožky alebo podráždenia očí vyhľadať lekársku pomoc.

Odporúča sa ošetriť zviera večer. Ošetrené psy by nemali spať s ľuďmi, hlavne s deťmi.

#### **4.6 Nežiaduce účinky (frekvencia a závažnosť)**

Pri nepatrnom počte psov je možné pozorovať prechodnú lokálnu reakciu v mieste aplikácie, ktorá vymizne v priebehu 48 hodín. Môže sa objaviť prechodná alopecia v mieste ošetrenia.

Po aplikácii sa môže vyskytnúť prechodná hyperestézia a svrbenie v mieste aplikácie.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť intoxikácie centrálného nervového systému a gastrointestinálne poruchy.

#### **4.7 Použitie počas gravidity, laktácie**

Štúdie na potkanoch preukázali, že permetrín má fetotoxické účinky. Nepodávať počas gravidity a laktácie.

#### **4.8 Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia**

Nie sú známe.

#### **4.9 Dávkovanie a spôsob podania lieku**

Na vonkajšie použitie.

Použitie u psov s hmotnosťou od 2 do 15 kg:

Rozhrnúť srst' medzi lopatkami tak, aby bola viditeľná koža. Vytlačiť 1 ml lieku Bob Martin Spot On priamo na kožu.

Použitie u psov s hmotnosťou nad 15 kg do 30 kg:

Rozhrnúť srst' medzi lopatkami tak, aby bola viditeľná koža. Vytlačiť 1 ml lieku Bob Martin Spot On priamo na kožu. Ďalší 1 ml aplikovať podobným spôsobom na koreň chvosta.

Vyhýbať sa aplikácii na srst'. Vyvarovať sa priameho kontaktu kože prstov s roztokom. Neošetrovať zviera v kratšom intervale ako 14 dní.

#### **4.10 Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá)**

Dvojnásobne prekročená odporúčaná dávka u dospelých psov nevyvoláva nežiaduce účinky. Klinické príznaky predávkovania sú typické pre intoxikáciu pyretridmi: hypersalivácia, diarea, tremor svalov a hyperestézia. U vážnejšie postihnutých zvierat sa môže pozorovať hypotermia alebo hypertermia, dyspnoe a kŕče. Akonáhle sa dostavia príznaky z predávkovania, je potrebné psy vykúpať v šampóne bez insekticídnych prísad a veterinárny lekár musí začať symptomatickú liečbu. Špecifické antidotum pri intoxikácii pyrethroidy nie je k dispozícii.

#### **4.11 Ochranné lehoty**

Netýka sa.

### **5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI**

#### **5.1 Farmakodynamické vlastnosti**

Farmakoterapeutická skupina: Ektoparazitikum, pyretríny a pyretroidy  
ATCved kód: QP53AC04

Permetrín je syntetický pyreteroid.

Mechanizmus insekticídneho účinku spočíva v navodení inhibície inaktiváciou sodíkových kanálov a v aktivácii draslíkom ovplyvnenej vodivosti na úrovni neurónového axonu parazita. To vedie k predĺženiu intervalov nervových vzruchov, k opakovanému dráždeniu neurónov po jednotlivých stimuloch a spontánnemu sledu nervových impulzov, ktoré následne spôsobujú paralýzu a úhyn hmyzu.

#### **5.2 Farmakokinetické vlastnosti**

Permetrín môže byť absorbovaný v limitovanom množstve po topickom podaní ľudskou pokožkou a kožou zvierat'a.

Metabolizmus permetrínu prebieha u cicavcov esterovým štiepením, hydroxyláciou dvojitej dimetylovej skupiny v kyslom prostredí alebo fenoxyskupiny alkoholu a konjugáciou vznikajúcich karboxylových kyselín a fenolov. Permetrínové izoméry, ich hydrolyzované produkty a metabolity sú rýchlo vylučované a nekumulujú sa v tkanivách vo významnom množstve.

### **6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE**

#### **6.1 Zoznam pomocných látok**

Dietyl glykolmonoetyléter

#### **6.2 Inkompatibility**

Nie sú známe.

### **6.3 Čas použiteľnosti**

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky

### **6.4 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie**

Uchovávať pri teplote do 25°C.

Chrániť pred mrazom.

Chrániť pred svetlom.

### **6.5 Charakter a zloženie vnútorného obalu**

Tuba s objemom 2 ml, z nepriehľadného, bieleho polypropylénu. Každá tuba obsahuje 1 ml lieku. Vonkajší obal tvorí blister z priehľadného PVC, ktorý je:

- zatažený na kartóne s potlačou: 1, 2, 3, 4, 6 alebo 8 túb; písomná informácia je vytlačená priamo na kartóne alebo

- vložený do papierovej škatuľky: 1 x 3, 2 x 3 alebo 7 x 3 túb; písomná informácia je vložená do papierovej škatuľky

Veľkosť balenia:

Malé psy: 1, 2, 3 alebo 4 tuby

Veľké psy: 2, 4, 6 alebo 8 túb

1 x 3, 2 x 3, 7 x 3 tuby

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

### **6.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov, prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používaní týchto liekov**

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Extrémne toxický pre ryby a vodné živočíchy. Nekontaminovať rybníky, vodné toky alebo vodné zdroje. Liek je veľmi toxický aj pre včely.

## **7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII**

Bob Martin (UK) Ltd., Wemberham Lane, Yatton, Somerset, BS49 4BS, Veľká Británia

Tel: +1934 831 000

Fax: +1934 831 050

## **8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO**

96/119/04-S

## **9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE**

30.4.2004

## **10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU**

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

**ZÁKAZ PREDAJA, DODÁVOK A/ALEBO POUŽÍVANIA** Netýka sa.

**<ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ALEBO AK LIEK NEMÁ VONKAJŠÍ OBAL, NA VNÚTORNOM OBALE>**

{DRUH/TYP}

Papierová škatuľka

**1. NÁZOV LIEKU**

**Bob Martin Permethrin Dog Spot On 744 mg roztok na kvapkanie na kožu –spot on**

**2. ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY**

Účinná látka:

Permethrinum (*cis* : *trans* = 25 : 75) 744 mg

Pomocné látky: Dietyl glykolmonoetyléter ad 1 ml

**3. LIEKOVÁ FORMA**

Roztok na nakvapkanie na kožu – spot on

**4. VEĽKOSŤ BALENIA**

1 x 3 tuby, (2 x 3 tuby alebo 7 x 3 tuby)

**5. CIEĽOVÝ DRUH**

Psy

**6. SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU**

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

**7. OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ**

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

**8. DÁTUM EXSPIRÁCIE**

EXP {mesiac/rok}

**9. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE**

Uchovávať pri teplote do 25°C.

Chrániť pred mrazom.

Chrániť pred svetlom.

**10. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY**

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Liek nesmie kontaminovať vodné toky pretože môže byť nebezpečný pre ryby a ďalšie vodné organizmy. Liek je veľmi toxický aj pre včely.

**11. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú**

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

**12. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHLĀDU DETÍ“**

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

**13. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII**

Bob Martin (UK) Ltd., Wemberham Lane, Yatton, Somerset, BS49 4BS, Veľká Británia

**14. REGISTRAČNÉ ČÍSLO**

96/119/04-S

**15. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE**

č. šarže {číslo}

**MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM  
OBALE**

{DRUH/TYP}

tuba

**1. MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY (LÁTKO)**

Permethrinum 744 mg

**2. OBSAH V OBJEMOVÝCH JEDNOTKÁCH**

1 ml

**3. ČÍSLO ŠARŽE**

<č. šarže> {číslo}

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA **BLISTROCH**  
{DRUH/TYP}

**1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU**

**Bob Martin Permethrin Dog Spot On 744 mg**

**2. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCI**

Bob Martin (UK) Ltd.

**3. DÁTUM EXPIRÁCIE**

EXP{mesiac/rok}

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

č. šarže {číslo}

**5. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“**

Len pre zvieratá.

OZNAČENIE NA VONKAJŠOM OBALE (kartón s potlačou) =  
**PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV**

**Bob Martin Permethrin Dog Spot On 744 mg roztok na kvapkanie na kožu –spot on**

**1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ IDENTICKÍ**

Bob Martin (UK) Ltd., Wemberham Lane, Yatton, Somerset, BS49 4BS, Veľká Británia

**2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU**

**Bob Martin Permethrin Dog Spot On 744 mg roztok na kvapkanie na kožu –spot on**

**3. ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA (LÁTKY) A INÉ ZLOŽKY**

Jedna tuba zodpovedajúca jednej dávke obsahuje:

Účinná látka:

Permethrinum (*cis : trans* = 25 : 75) 744 mg

Pomocné látky:

Dietylglýkolmonoetyléter ad 1 ml

Číry, bledý jantárový roztok.

**4. INDIKÁCIA(-E)**

Zamorenie parazitmi citlivými na permetrín:

Eliminácia blch (*Ctenocephalides felis*) a kliešťom (*Ixodes ricinus* a *Rhipicephalus sanguineus*).

Prevenia proti zamoreniu blchami (*Ctenocephalides felis*) na 4 týždne.

Liek má 4 týždne pretrvávajúci akaricídny účinok proti invázii kliešťom (*Ixodes ricinus* a *Rhipicephalus sanguineus*).

**5. KONTRAINDIKÁCIE**

Nepoužívať u šteniat do veku 3 mesiacov.

Nepoužívať u šteniat a psoch do živej hmotnosti pod 2 kg.

Bezpečnosť lieku počas gravidity a laktácie nebola stanovená. Použitie u gravidných a laktujúcich súk nie je odporúčané. (pozri bod 12.)

Nepodávať psom so známou hypersenzitivitou na ktorúkoľvek zložku lieku.

Nepoužívať u chorých psov alebo u psov v rekonvalescencii alebo v prípade prítomnosti kožných lézií.

**NEPOUŽÍVAŤ U MAČIEK.** Tento liek je extrémne toxický pre mačky a môže spôsobiť úhyn.

Na ochranu mačiek pred náhodnou expozíciou je potrebné 72 hodín po ošetrení psa zvieratá držať

oddelene. Je veľmi dôležité sa uistiť, že nemôže dôjsť k obtieraniu sa mačky o psa v mieste aplikácie lieku. V prípade náhodnej expozície mačky je potrebné vyhľadať veterinárneho lekára.

**6. NEŽIADUCE ÚČINKY**

Pri nepatrnom počte psov je možné pozorovať prechodnú lokálnu reakciu v mieste aplikácie, ktorá vymizne v priebehu 48 hodín. Môže sa objaviť prechodná alopecia v mieste ošetrenia.

Po aplikácii sa môže vyskytnúť prechodná hyperestézia a svrbenie v mieste aplikácie.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť intoxikácie centrálného nervového systému a gastrointestinálne poruchy.

## 7. CIEĽOVÝ DRUH

Psy

## 8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Na vonkajšie použitie.

### Použitie u psov s hmotnosťou od 2 do 15 kg:

Rozhrnúť sršť medzi lopatkami tak, aby bola viditeľná koža. Vytlačiť 1 ml lieku Bob Martin Spot On priamo na kožu.

### Použitie u psov s hmotnosťou nad 15 kg do 30 kg:

Rozhrnúť sršť medzi lopatkami tak, aby bola viditeľná koža. Vytlačiť 1 ml lieku Bob Martin Spot On priamo na kožu. Ďalší 1ml aplikovať podobným spôsobom na koreň chvosta.

## 9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Vyhýbať sa aplikácii na sršť. Vyvarovať sa priameho kontaktu kože prstov s roztokom. Neošetrovať zvieratá v kratšom intervale ako 14 dní.

## 10. OCHRANNÁ LEHOTA

Netýka sa.

## 11. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávať pri teplote do 25°C.

Chrániť pred mrazom.

Chrániť pred svetlom.

Nepoužívať liek po uplynutí dátumu expirácie uvedeného na obale.

## 12. OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Pri prvej aplikácii zvieratá sa v mieste aplikácie prechodne môže objaviť mierne mastný flák, u zvierat so svetlou sršťou s nádychom žltej farby.

Ak sa u ošetrovaných zvierat prejavia alebo pretrvávajú príznaky intoxikácie, je potrebné vyhľadať veterinárneho lekára.

Vyhýbať sa častému plávaniu alebo šampónovaniu zvierat, môže to znížiť účinnosť lieku.

Ak je v domácnosti viac psov, musia byť ošetrené všetky naraz. Mačky v rovnakej domácnosti musia byť ošetrené iným liekom určeným pre mačky.

Blechy domácich zvierat sa často dostávajú do košov, ležoviek a do miest pravidelného odpočinku, ako sú koberce a súčasti zariadenia. Preto sa musia tieto miesta pravidelne ošetrovať insekticídnym liekom a pravidelne vysávať.

### **Predávkovanie**

Klinické príznaky predávkovania sú typické pre intoxikáciu pyreteroidmi: hypersalivácia, diarea, tremor svalov a hyperestézia. U vážnejšie postihnutých zvierat sa môže pozorovať hypotermia alebo hypertermia, dyspnoe a kŕče. Akonáhle sa dostavia príznaky z predávkovania, je potrebné psy vykúpať v šampóne bez insekticídných prísad a veterinárny lekár musí začať symptomatickú liečbu. Špecifické antidotum pri intoxikácii pyreteroidy nie je k dispozícii.

### **Použitie počas gravidity, laktácie**

Štúdie na potkanoch preukázali, že permethrin má fetotoxické účinky. Nepodávať počas gravidity a laktácie.

### **Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám.**

Po manipulácii s liekom si umyť ruky vodou a mydlom.

Vyhýbať sa priamemu kontaktu lieku s rukami. Zasiahnuté miesto okamžite opláchnuť.

Predchádzať kontaktu s očami. V prípade zasiahnutia očí okamžite vypláchnuť zasiahnuté oko prúdom čistej vody.

Odporúča sa používať ochranné rukavice počas ošetrovania zvierat liekom.

Osoby aplikujúce liek väčšiemu množstvu zvierat by mali používať ochranné gumové alebo latexové rukavice s minimálnou hrúbkou 0,3 mm.

Ošetrované zvieratá by nemali byť v blízkosti otvoreného ohňa, kým liek na nich neuschne.

Nefajčiť počas aplikácie lieku zvieratú.

Nedotýkať sa ošetrovaného miesta 3 – 6 hodín po aplikácii.

Ľudia so známou precitlivosťou na pyretroidy by sa mali vyhýbať aplikácii tohto veterinárneho lieku.

U osôb podávajúcich liek zvieratám môže permethrin spôsobiť kožnú parestéziu (zncitlivenie) počas 1 – 2 hodín.

V prípade náhodného užitia vyhľadať lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľov alebo etiketu lekárovi. V prípade pretrvávajúceho svrbenia pokožky alebo podráždenia očí vyhľadať lekársku pomoc.

Odporúča sa ošetriť zviera večer. Ošetrované psy by nemali spať s ľuďmi, hlavne s deťmi.

### **13. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADOU POTREBY**

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Extrémne toxický pre ryby a vodné živočíchy. Nekontaminovať rybníky, vodné toky alebo vodné zdroje. Liek je veľmi toxický aj pre včely.

### **14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍ SOMNEJ INFORMÁCII PRE POUŽÍVATEĽOV**

### **15. ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Len pre zvieratá.

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Veľkosť balenia:

Malé psy: 1, 2, 3 alebo 4 tuby

Veľké psy: 2, 4, 6 alebo 8 túb

1 x 3, 2 x 3, 7 x 3 tuby

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

*PI pre kartón:* +

**Registračné číslo:**

96/119/04-S

**Exp:**

(mesiac/rok)

**Číslo šarže:**

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:



