

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Schachtel mit einer Durchstechflasche mit 100 ml oder 500 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

MULTIMIN Injektionslösung für Rinder

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Zink: 60 mg (entspricht Zinkoxid 74,68 mg)

Mangan: 10 mg (entspricht Mangankarbonat 20,92 mg)


Kupfer: 15 mg (entspricht Kupferkarbonat 26,09 mg)

Selen: 5 mg (entspricht Natriumselenit 10,95 mg)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml

500 ml

4. ZIELTIERART(EN)**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Nur zur subkutanen Anwendung. Nicht intramuskulär anwenden.

Dosierung:

Rinder - bis zu 1 Jahr: 1 ml pro 50 kg

Rinder - zwischen 1-2 Jahren: 1 ml pro 75 kg

Rinder - über 2 Jahre: 1 ml pro 100 kg

Maximales Volumen pro Injektionsstelle: 7 ml.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 28 Tage.

Milch: Null Stunden.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verwenden. Verwendbar bis ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Warburton Technology Limited

14. ZULASSUNGNUMMERN

BE-V583733

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**Durchstechflasche mit 100 ml und 500 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

MULTIMIN Injektionslösung für Rinder

2. WIRKSTOFF(E)


Jeder ml enthält:

Zink: 60 mg (entspricht Zinkoxid 74,68 mg)

Mangan: 10 mg (entspricht Mangankarbonat 20,92 mg)

Kupfer: 15 mg (entspricht Kupferkarbonat 26,09 mg)

Selen: 5 mg (entspricht Natriumselenit 10,95 mg)

3. ZIELTIERART(EN)**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Nur zur subkutanen Anwendung. Nicht intramuskulär anwenden.

Dosierung:

Rinder - bis zu 1 Jahr: 1 ml pro 50 kg

Rinder - zwischen 1-2 Jahren: 1 ml pro 75 kg

Rinder - über 2 Jahre: 1 ml pro 100 kg

Maximales Volumen pro Injektionsstelle: 7 ml.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 28 Tage.

Milch: Null Stunden.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verwenden. Verwendbar bis ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Warburton Technology Limited

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}