



## ETIQUETADO Y PROSPECTO

### ETIQUETA-PROSPECTO

Envase a presión de 270 ml con 207 ml de contenido  
(67 ml de solución activa y 140 ml de gas propelente).

Código Nacional:  
Símbolo (situado en el ángulo superior derecho): "O"

### PEDERIPRA SPRAY

PEDERIPRA SPRAY 20 mg/ml suspensión para pulverización cutánea.

### COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S)

#### Sustancia activa:

##### Cada ml contiene:

Clortetraciclina (hidrocloruro) ..... 20 mg

### INDICACIÓN(ES) DE USO

Tratamiento de heridas superficiales traumáticas o quirúrgicas, contaminadas por microorganismos sensibles a la clortetraciclina.

Coadyuvante en el tratamiento de infecciones superficiales de las pezuñas y la piel, en particular dermatitis interdigital (pedero) y dermatitis digital causadas por microorganismos sensibles a la clortetraciclina.

### CONTRAINDICACIONES

No usar en caso de hipersensibilidad a las tetraciclinas o a algún excipiente.

No aplicar el medicamento en ubres de animales en lactación si la leche va destinada al consumo humano.

### REACCIONES ADVERSAS

Pueden producirse reacciones de hipersensibilidad.

### ESPECIES DE DESTINO

Gatos, perros, porcino, ovino, caprino y bovino.

### POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

#### Uso cutáneo

Antes de la aplicación, limpiar la zona afectada, eliminando tejidos necrosados. Agitar energéticamente el envase antes de utilizarlo.

Pulverizar la zona afectada desde una distancia de 20 cm durante unos segundos (la coloración de la zona tratada debe ser homogénea). Repetir el tratamiento según evolución y gravedad de las lesiones.

### TIEMPO DE ESPERA

Carne: cero días.

Leche: cero días.

Véase asimismo el apartado contraindicaciones.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-01-03

## PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener protegido de la luz solar directa o focos de ignición, no exponerlo a temperaturas superiores a 45 °C.

Periodo de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 24 meses.

## ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)

### Precauciones especiales para su uso en animales

- Proteger los ojos del animal cuando se aplica el tratamiento en zonas cercanas a la cabeza. La aplicación sobre los ojos pueden producir irritación local. Antes de la aplicación, limpiar la zona afectada eliminando suciedad y tejidos necrosados.
- Evitar que el animal lama la zona tratada o las zonas tratadas de otros animales.
- Siempre que sea posible, el uso del antimicrobiano debe basarse en pruebas de sensibilidad.

Si esto no es posible, el tratamiento debe basarse en la información epidemiológica local (regional, a nivel de explotación) sobre la sensibilidad de las diferentes cepas de las especies bacterianas habitualmente implicadas en el proceso infeccioso.

El uso prolongado de agentes antimicrobianos puede dar lugar a una superinfección por crecimiento de organismos no susceptibles, incluyendo hongos.

Efectuar el tratamiento de los animales en zonas bien ventiladas.

### Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales

Envase a presión. No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente.

Las personas con hipersensibilidad conocida a las tetracicilinas deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

Evitar el contacto con la piel, debido al riesgo de sensibilización y dermatitis de contacto.

Usar un equipo de protección personal consistente en guantes impermeables al manipular el medicamento veterinario.

Evitar el contacto con los ojos debido al riesgo de irritación ocular. Proteger adecuadamente los ojos y la cara.

Evitar inhalar los vapores. Efectuar el tratamiento en zonas bien ventiladas o al aire libre.

No comer, beber ni fumar mientras se utiliza el medicamento.

Lavarse las manos tras su aplicación.

### Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos), en caso necesario

El modo de empleo del producto hace improbable una intoxicación por sobredosificación.

## PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Pregunte a su veterinario cómo debe deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

## FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

15 de octubre de 2014

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Formato:** 270 ml

Uso veterinario - medicamento sujeto a prescripción veterinaria.  
Administración bajo control o supervisión del veterinario.

Lote (número)

Fecha de caducidad: {Mes/Año}

Reg. nº 323 ESP

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES**

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

España



Aerosol extremadamente inflamable