

NAVODILO ZA UPORABO

LIVACOX T peroralna suspenzija za piščance

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER PROIZVAJALEC ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

GENERA SI d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, Slovenija

Proizvajalec odgovoren za sproščanje serij:

GENERA d.d., Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Hrvaška

in

Biopharm – Research Institute of Biopharmacy and Veterinary Drugs, CZ-254 49 Jilove, Češka

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

LIVACOX T peroralna suspenzija za piščance

Eimeria tenella, *E. Acervulina* in *E. maxima*

3. NAVEDBA UČINKOVIN IN DRUGIH SESTAVIN

1 odmerek cepiva vsebuje:

Učinkovine:

Eimeria tenella 300 do 500 oocist atenuiranega seva

E. acervulina 300 do 500 oocist atenuiranega seva

E. maxima 300 do 500 oocist atenuiranega seva

suspendiranih v 1 % vodni raztopini kloramina B

1 ml cepiva vsebuje 100 odmerkov za cepljenje.

Pomožna snov:

Kloramin B

4. INDIKACIJE

Preprečevanje kokcidioze pri brojlerjih, ki jo povzročajo *Eimeria acervulina*, *E. maxima* in *E. tenella*. Izmed 7 kokcidijev, ki parazitirajo pri domači perutnini, so te 3 vrste ekonomsko pomembne pri pitanju brojlerjev.

5. KONTRAINDIKACIJE

Kontraidicirano je uporabljati antikokcidijska sredstva 2 dni pred cepljenjem s cepivom LIVACOX T in 14 dni po njem ter zdravljenje s sulfonamidi v tem istem obdobju.

6. NEŽELENI UČINKI

Začasno poslabšanje konverzije krme je mogoče opaziti pri piščancih 1-2 tedna po cepljenju.

Če opazite neželene učinke tega zdravila, takoj obvestite pristojni organ za farmakovigilanco in imetnika dovoljenja za promet.

Če opazite kakršne koli stranske učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo ali mislite, da zdravilo ni delovalo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Piščanci.

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Priporočena metoda dajanja cepiva je odmerjanje cepiva v vodo za pitje.

Piščance cepimo v starosti od 1 do 10 dni. Cepivo dajemo v vodi za pitje.

Odmerjanje

Količino cepiva in vode, v kateri je le to suspendirano, je treba prilagoditi številu in starosti piščancev.

Za optimalno odmerjanje potrebne količine vode za pitje uporabljamo naslednjo formulo:

Število (tisoč) x starost piščancev (dni) = količina vode v litrih.

Npr. za cepljenje 1000 piščancev, starih 5 dni, je treba 10 ml cepiva (1 ml cepiva = 100 odmerkov) resuspendirati v 5 l vode za pitje ($1 \times 5 = 5$), oz. za cepljenje 5000 piščancev, starih 7 dni, je treba resuspendirati 50 ml cepiva LIVACOX T v 35 l vode za pitje ($5 \times 7 = 35$).

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Pred uporabo je treba platenko s cepivom dobro pretresti in suspendirati v ustrezni količini čiste vode.

Da bi piščanci postali žejni, jim vodo odvzamemo 3 ure pred cepljenjem.

Napajalnega prostora mora biti dovolj, da bodo vsi piščanci lahko pili, vodo s cepivom pa popili v dveh urah.

LIVACOX T lahko dajemo preko ročnih in avtomatskih napajalnih sistemov, vključno s kapljičnimi napajalniki (nipple).

10. KARENCA

Nič dni.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom

Shranjujte v hladilniku (2 °C - 8 °C).

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za prodajo je označen na ovojnini (9 mesecev).

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini po EXP.

Rok uporabnosti po razredčenju v skladu z navodili: uporabite takoj.

12. POSEBNA OPOZORILA

Posebna opozorila za vsako živalsko vrsto:

Cepimo zdrave piščance v dobrih higienskih pogojih.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:

Živali morajo biti dovolj žejne, da bodo vodo s cepivom popile v dveh urah.

Pred uporabo je treba plastenko s cepivom dobro pretresti in suspendirati v takšni količini vode za pitje, kolikor jo bodo žejne živali lahko popile v dveh urah po odmerjanju cepiva.

Zagotovimo zadostno število napajalnih mest, da vsi piščanci popijejo potreben odmerek cepiva.

V času celotne vzreje ne uporabljamo kokcidostatikov v hrani in vodi za pitje.

Kadar pošiljamo v diagnostične preiskave (patološko - anatomske ali parazitološke) vzorce ali trupla poginulih piščancev, moramo v anamnestičnih podatkih navesti, da so bile živali cepljene proti kokcidiozi s cepivom Livacox T.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

Pri rokovanju z zdravilom je priporočljivo uporabljati osebno zaščitno opremo - rokavice, saj cepivo vsebuje kloramin B, ki lahko pri občutljivih ljudeh draži kožo ali dihalne poti.

Nesnost:

Cepivo ni namenjeno za uporabo v obdobju nesnosti.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:

Glejte poglavje 5. Kontraindikacije.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi):

Ni neželenih učinkov tudi pri desetkratnem predoziranju.

Inkompatibilnosti:

Ne mešajte z nobenim drugim zdravilom.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Ne odvrzite zdravila v odpadno vodo ali v gospodinske odpadke.

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITEV NAVODIL ZA UPORABO

Oktober 2020

15. DRUGE INFORMACIJE

Delovanje

Cepivo spodbuja tvorbo specifičnih protiteles proti kokcidiozi pri brojlerjih.

Imunost

Imunost se razvije 10 do 14 dni po cepljenju, t. j. po 2 do 3 razvojnih cikli kokcidijev in traja dosmrtno za vrste kokcidijev, ki jih cepivo vsebuje.

Način izdaje zdravila

Na veterinarski recept.

Oprema

Plastenka z navojnim zamaškom po 10 ml (1000 odmerkov) cepiva

Plastenka z navojnim zamaškom po 50 ml (5000 odmerkov) cepiva

Škatla z 10 plastenkami po 10 ml (10 x 1000 odmerkov) cepiva
Škatla z 10 plastenkami po 50 ml (10 x 5000 odmerkov) cepiva

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.