

ANEKS III
OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Advantix 40 mg + 200 mg roztwór do nakrapiania

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda pipetka (0,4 ml) zawiera: 40 mg imidakloprydu oraz 200 mg permetryny

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 pipetka
2 pipetki
3 pipetki
4 pipetki
6 pipetek

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT



≤ 4 kg

5. WSKAZANIA LECZNICZE

Zapobieganie i zwalczanie infestacji kleszczy (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor* spp.) oraz pcheł (*Ctenocephalides* spp.) u psów, a także odstraszenie komarów i muchówek (*Phlebotomus* sp.).

Jednorazowe zastosowanie weterynaryjnego produktu leczniczego zapobiega dalszej infestacji kleszczy przez cztery tygodnie. Kleszcze są odstraszane oraz/lub zabijane, przez co ogranicza się ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych (np. boreliozy, riketsjozy, erlichiozy).

Pchły na psie giną w ciągu jednego dnia od rozpoczęcia leczenia. Jednorazowe zastosowanie weterynaryjnego produktu leczniczego zapobiega dalszej infestacji pcheł przez cztery tygodnie.

Weterynaryjny produkt leczniczy może być stosowany jako element terapii alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

Jednorazowe zastosowanie weterynaryjnego produktu leczniczego zapewnia widoczne działanie odstraszające wobec meszek, komarów i muchówek w ciągu czterech tygodni, zmniejszając przez to ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych (np. leishmaniozy).

6. DROGI PODANIA

Przez nakrapianie. Zalecana minimalna dawka wynosi: 10 mg/kg masy ciała imidakloprydu i 50 mg/kg masy ciała permetryny, podawane zewnętrznie na skórę.

Nie stosować u szczeniąt poniżej 7 tygodnia życia.

7. OKRESY KARENCJI

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Wszystkie pipetki należy zużyć w ciągu 2 lat od otwarcia torebki foliowej lub przed upływem „Exp” jeśli upływa wcześniej.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nie zamrażać.

Przechowywać z daleka od żywności, napojów i środków żywienia zwierząt.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Elanco 

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia: 1411/04

15. NUMER SERII

Lot



Nie stosować u kotów.



**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

PIPETKA

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Advantix



≤ 4 kg



2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

0,4 ml

3. NUMER SERII

Lot

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.{mm/rrrr}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

BLISTER

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Advantix



≤ 4 kg



2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

0,4 ml

3. NUMER SERII

Lot

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.{mm/rrrr}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

TOREBKA FOLIOWA

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Advantix



≤ 4 kg



2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

0,4 ml

100 mg/ml imidaclopridum
500 mg/ml permethrinum

3. NUMER SERII

Lot

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.{mm/rrrr}

Wszystkie pipetki należy zużyć w ciągu 2 lat od otwarcia torebki foliowej.