

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/03/1589

CANIVERM tbl. ad us. vet. tabletes suņiem, kaķiem, vilkiem, šakāļiem, lauvām un hiēnām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Bioveta, a. s.

Komenského 212/12

683 23 Ivanovice na Hané

Čehijas Republika

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

CANIVERM tbl. ad us. vet. tabletes suņiem, kaķiem, vilkiem, šakāļiem, lauvām un hiēnām
Fenbendazole, Pyrantely embonas, Praziquantel

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 tablete – 0,7 g satur:

Aktīvās vielas:

Fenbendazols 150 mg

Pirantela embonāts 144 mg

Prazikvantels 50 mg

Ovālas, iedzeltenas, abpusēji izliektas tabletes ar sīkiem plankumiem un abpusēju dalījuma līniju vidū.

1 tablete – 0,175 g satur:

Aktīvās vielas:

Fenbendazols 37,5 mg

Pirantela embonāts 36,0 mg

Prazikvantels 12,5 mg

Apaļas, iedzeltenas tabletes ar sīkiem plankumiem un dalījuma līniju vienā pusē.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Jauktas apaļtārpu un lenteņu izraisītas invāzijas ārstēšanai suņiem, kaķiem, vilkiem, šakāļiem, lauvām, hiēnām, kuru ierosina sekojošas parazītu sugas:

Apaļtārpi: *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*,

Āķtārpi: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*,

Matgalvjī: *Trichuris vulpis*,

Lenteņi: *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp.,
Taenia multiceps, *Mesocestoides* spp.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām. Nelietot aknu funkciju traucējumu, intraokulārās cisticerkozes un mugurkaula neurocisticerkozes gadījumā.

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīnu vai citiem antihelmintiskiem līdzekļiem.

Nelietot dzīvniekiem, kuriem novēro citu, ne zarnu parazītu invāzijas izraisītu, slimību simptomus.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Dažu stundu laikā pēc zāļu lietošanas var parādīties vemšana, mīksta fekālija, nātrene vai drudzis. Tā ir reakcija uz olbaltumvielām, ko izdala bojāejošie parazīti, nevis zāļu izraisītas reakcijas. Zāles var izraisīt dzīvniekam miegainību.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi, kaķi, vilki, šakāļi, lauvas, hiēnas.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai.

Kucēniem, mazo šķirņu suņiem un kaķiem:

- 1 tablete 0,175 g uz 0,5 - 2 kg ķermeņa svara.

- 1/2 tablete 0,7 g vai 2 tabletes 0,175 g uz 2 - 5 kg ķermeņa svara.

Vidējo šķirņu suņiem:

- 1 tablete 0,7 g vai 4 tabletes 0,175 g uz 5 - 10 kg ķermeņa svara.

Lielo šķirņu suņiem un vilkiem, šakāļiem, lauvām, hiēnām:

- 1 tablete 0,7 g uz katriem 10 kg ķermeņa svara.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Devu programma jānosaka, konsultējoties ar veterinārārstu. Kucēnus un kaķēnus attārpo no 3 nedēļu vecuma ik pēc 3 nedēļām līdz 12 nedēļu vecumam. Pēc tam tos regulāri attārpo ik pēc 3 mēnešiem.

Tabletes var dot atsevišķi vai paslēpjot barības gabaliņā. Nedot kopā ar piena produktiem.

Vilkiem, šakāļiem, lauvām, hiēnām ieteicams lietot tabletes (proporcionāli to sveram) saberztā veidā iejauktas gaļas masā. Šīs gaļas bumbiņas novietot attiecīgā skaitā krātiņos pirms rīta ēdināšanas.

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk.

Rūpīgi iztīrīt un dezinficēt dzīvnieka apkārtējo vidi, lai novērstu atkārtotu invāziju.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Sargāt no gaismas. Uzglabāt sausā vietā, cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā.

Iznīcināt visas neizlietotās tablešu daļas.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc EXP: {mēnesis/gads}.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Blusas kalpo kā starpsaimnieki plaši izplatītajam lenteņu tipam – *Dipylidium caninum*. Lenteņu invāzija noteikti atkārtosies, ja netiks veikta to starpsaimnieku, piemēram, blusu, peļu u.c. apkarošana. Parazītu rezistence pret jebkuru konkrētās grupas antihelmintisku līdzekli var attīstīties pēc biežas, atkārtotas šīs grupas antihelmintisko līdzekļu lietošanas.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Pēc zāļu lietošanas mazgāt rokas.

Grūsnība un laktācija:

Lietojot grūsniem dzīvniekiem, jāievēro precīza deva.

Drīkst lietot laktācijas laikā.

Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīnu vai citiem antihelmintiskiem līdzekļiem.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Desmitkārtīga deva neizraisa nevēlamas parādības mērķa dzīvniekiem.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

04/2021

15. CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.