

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Kartonschachtel / 1 × 10 ml (5 Dosen), 1 × 50 ml (25 Dosen), 1 × 100 ml (50 Dosen), 1 × 250 ml (125 Dosen)

Plastikschachtel / 10 × 10 ml (10 × 5 Dosen)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Suigen Entero 3 Emulsion zur Injektion für Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis (2 ml) enthält:

Wirkstoffe:

Porzines Rotavirus, Serogruppe A, Stamm OSU 6, inaktiviert

RP ≥ 1*

E. coli, Serotyp O149:K88 (F4ac), inaktiviert

RP ≥ 1*

E. coli, Serotyp O101:K99 (F5 und F41), inaktiviert

RP ≥ 1* (F5), RP ≥ 1* (F41)

E. coli, Serotyp K85:987P (F6), inaktiviert

RP ≥ 1*

Clostridium perfringens, Typ C, beta Toxoid

RP ≥ 1*,**

*, ** siehe Packungsbeilage für Details

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 × 10 ml (5 Dosen)

1 × 50 ml (25 Dosen)


1 × 100 ml (50 Dosen)

1 × 250 ml (125 Dosen)

10 × 10 ml (10 × 5 Dosen)

4. ZIELTIERART(EN)

Schweine (trächtige Jungsauen und Sauen)

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.
Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

BIOVETA, a.s.

Mitvertrieb und örtlicher Vertreter des Zulassungsinhabers:
Deutschland: VIRBAC Tierarzneimittel GmbH
Österreich: VIRBAC Österreich GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Deutschland:
Österreich:

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Etikett für Glasflaschen / 100 ml (50 Dosen)

Etikett für Plastikflaschen / 100 ml (50 Dosen), 250 ml (125 Dosen)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Suigen Entero 3 Emulsion zur Injektion für Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Dosis (2 ml) enthält:

Wirkstoffe:

Inaktiviert:

Porzines Rotavirus, Serogruppe A, OSU 6,	RP \geq 1
<i>E. coli</i> O149:K88 (F4ac)	RP \geq 1
<i>E. coli</i> O101:K99 (F5 und F41)	RP \geq 1 (F5), RP \geq 1 (F41)
<i>E. coli</i> K85:987P (F6)	RP \geq 1
<i>C. perfringens</i> , Typ C, beta Toxoid	RP \geq 1


Für Details siehe Packungsbeilage.

100 ml (50 Dosen)

250 ml (125 Dosen)

3. ZIELTIERART(EN)

Schweine (trächtige Jungsauen und Sauen)



4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

BIOVETA, a.s.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}


MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Etikett für Glasflasche / 10 ml (5 Dosen), 50 ml (25 Dosen)

Etikett für Plastikflasche / 50 ml (25 Dosen)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Suigen Entero 3



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Jede Dosis (2 ml) enthält:

Inaktiviert:

Porzines Rotavirus, Serogruppe A, OSU 6; *E. coli* O149:K88 (F4ac); *E. coli*, O101:K99 (F5 und F41);

E. coli K85:987P (F6); *C. perfringens*, Typ C, beta Toxoid

RP \geq 1 für jede Komponente – siehe Packungsbeilage.

10 ml (5 Dosen)

50 ml (25 Dosen)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

