

## **A. KENNZEICHNUNG**

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

### UMKARTON

#### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix 400 mg + 2 000 mg Spot-on Lösung zum Auftropfen

#### 2. WIRKSTOFF(E)

Jede 4,0 ml Pipette mit enthält:  
400 mg Imidacloprid, 2 000 mg Permethrin

#### 3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Pipette  
2 Pipetten  
3 Pipetten  
4 Pipetten  
6 Pipetten  
24 Pipetten



#### 4. ZIELTIERART(EN)



> 25 kg ≤ 40 kg

#### 5. ANWENDUNGSGEBIETE

Vorderseite des Umkartons:

Abtötende Wirkung gegen Zecken, Flöhe und Haarlinge.

Repellierende Wirkung gegen Zecken, Stechmücken, Sandmücken und Stechfliegen.

Reduktion des Risikos der Übertragung von Hunde-Leishmaniose und Hunde-Ehrlichiose.



Zecke



Floh



Stechmücke



Sandmücke



Stechfliege



Haarling



## Leishmaniose

**Nicht bei Katzen anwenden.**



### Rückseite des Umkartons:

Abtötende Wirkung gegen Flöhe (Vorbeugung und Behandlung); kann als Teil einer Behandlungsstrategie gegen Flohallergiedermatitis (FAD) eingesetzt werden. Bietet eine larvizide Wirkung gegen Flöhe in der unmittelbaren Umgebung der behandelten Hunde.

Abtötende Wirkung gegen Haarlinge.

Repellierende und abtötende Wirkung gegen Zecken; reduziert das Risiko der Übertragung von durch Vektoren übertragenen Krankheiten bei Hunden (wie Borreliose, Rickettsiose und Ehrlichiose).

Repellierende Wirkung gegen Stechmücken und Sandmücken; reduziert das Risiko der Übertragung von Leishmaniose.

Repellierende Wirkung gegen Stechfliegen; trägt zur Verbeugung von durch Fliegenstiche verursachter Dermatitis bei.

Kann bei trächtigen und laktierenden Hündinnen angewendet werden.

Behält seine Wirksamkeit auch bei Nässe.


## 6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Auftropfen.

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Eine Pipette für Hunde  $> 25 \text{ kg} \leq 40 \text{ kg}$

[Hundeapplication – Piktogramm (größenspezifisch entsprechend der Produktgröße)]



Nicht bei unter sieben Wochen alten Welpen oder einem Körpergewicht von weniger als 25 kg anwenden.

## 7. WARTEZEITEN

## 8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen des Aluminiumbeutel innerhalb von 2 Jahren verbrauchen.

Nach Anbruch der Pipette sofort verwenden.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht einfrieren.

Nach Öffnen des Aluminiumbeutels trocken und nicht über 30°C lagern.

Bewahren Sie den Aluminiumbeutel mit den Blisterpackungen im Umkarton auf.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Elanco 

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

DE: Zul.-Nr.: 400738.03.00

AT: Z. Nr.: 8-00604

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**

**PIPETTE**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Advantix



> 25 kg ≤ 40 kg



**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

4,0 ml

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**

**BLISTER**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Advantix



> 25 kg ≤ 40 kg



**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

4,0 ml

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

## MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

### ALUMINIUMBEUTEL

#### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix



> 25 kg ≤ 40 kg



#### 2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

4,0 ml

100 mg/ml Imidacloprid

500 mg/ml Permethrin

#### 3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

#### 4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen des Aluminiumbeutels innerhalb von 2 Jahren verbrauchen.