

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

Офтоциклин 10 mg/g маз за очи за кучета, котки и коне

2. Състав

Всеки грам съдържа:

Активни вещества:

Chlortetracycline 9,3 mg
(еквивалентен на 10,0 mg chlortetracycline hydrochloride)

Жълтеникава до жълта хомогенна маз.

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Кучета, котки и коне.

4. Показания за употреба

Лечение на бактериални инфекции на окото (кератит, конюнктивит и блефарит), причинени от *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Proteus* spp. и/или *Pseudomonas* spp.

5. Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към активното вещество, към други тетрациклини или към някое(и) от помощните вещества.

6. Специални предупреждения

Специални предупреждения:

Употребата на ветеринарния лекарствен продукт трябва да се базира на тестове за идентифициране и чувствителност на прицелния(ните) патоген(и). Ако това не е възможно, терапията трябва да се базира на епидемиологична информация и на информацията за чувствителността на прицелните патогени на ниво ферма или на местно/регионално ниво. Употребата на ветеринарния лекарствен продукт трябва да бъде в съответствие с официалните, национални и регионални антимикробни политики.

Употребата на ветеринарния лекарствен продукт, отклоняваща се от инструкциите, дадени в КХП, може да увеличи разпространението на бактерии, резистентни към хлортетрациклин, и може да понижи ефективността от лечението с други тетрациклини, поради възможността за кръстосана резистентност.

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Този ветеринарен лекарствен продукт може да причини кожна сенсибилизация, реакции на свръхчувствителност и/или раздразнение на очите.

Хора с установена свръхчувствителност към тетрациклини трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

Трябва да се избягва контакт с кожата и очите.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от непромокаеми ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт.

При случаен контакт с кожата, измийте изложения участък с вода и сапун. Ако след експозиция се развият симптоми, като например кожен обрив, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикетата на продукта.

При случаен контакт с очите, незабавно измийте с чиста вода. Ако раздразнението продължава, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

След употреба измийте ръцете.

Бременност и лактация:

Безопасността на ветеринарния лекарствен продукт не е доказана по време на бременност и лактация. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

7. Неблагоприятни реакции

Кучета, котки, коне:

Много редки (по-малко от 1 на 10 000 третирани животни, включително изолирани съобщения):	Реакция на мястото на приложение Нарушение, свързано с очите (напр. раздразнение на окото, сърбеж в окото, подуто окото, зачервяване на окото)
----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия или на местния представител на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване:

Bulgarian Food Safety Agency

Website:

<https://kvmp.bfsa.bg/phv>

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

Очно приложение.

Конне: Прилагайте 2-3 cm от мазта (в зависимост от размера на животното) в конюнктивалния сак 4 пъти на ден в продължение на 5 дни. Ако след 3 дни лечение не е настъпило клинично подобрене, трябва да се обмисли алтернативна терапия.

Кучета и котки: Прилагайте 0,5-2 cm от мазта (в зависимост от размера на животното) в конюнктивалния сак 4 пъти на ден в продължение на 5 дни. Ако след 3 дни лечение не е настъпило клинично подобрене, трябва да се обмисли алтернативна терапия.

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

10. Карентни срокове

Месо и вътрешни органи: 1 ден.

Не се разрешава за употреба при кобили, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да не се съхранява при температура над 25 °C.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 14 дни.

Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета и картоната след Годен до: **Exp.** Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар или фармацевт как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

0022-2745

Картонена кутия с 1 алуминиева туба от 5 g.

15. Дата на последната редакция на текста

07/2025

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия

Le Vet. Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater,

Нидерландия

Производител, отговарящ за освобождаването на партиди:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

Нидерландия

Местни представители и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

АСКЛЕП-ФАРМА ООД

гр. София 1324, ж.к. "Люлин - 7", бл. 711А, магазин 3, Република България

Тел: +359 888837191

За всякаква информация относно този ветеринарен лекарствен продукт, моля, свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за търговия.

17. Допълнителна информация

19.8.2025 г.

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП

Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV