

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE
DUOWIN CONTACT SPOT-ON sol. ad us.vet.

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

VIRBAC SA, 1^{ÈRE} AVENUE – L.I.D. – 2065 M, 06516 – CARROS (FRANCIE)

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DUOWIN CONTACT roztok pro nakapání na kůži, spot-on
Permethrinum, Pyriproxyfenum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivé látky:

Permethrinum	400 mg
Pyriproxyfenum	3 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxyanisol (E 320).....	0,2 mg
Butylhydroxytoluen (E 321)	0,1 mg

4. INDIKACE

Infestace parazity citlivými na permethrin a pyriproxyfen.

Léčba a prevence infestací blechami a klíšťaty.

Proti blechám:

Prevence nových infestací dospělými blechami po dobu 4 týdnů.

Prevence rozmnožení blech po dobu 8 týdnů díky přerušení vývoje vajíček a larev do stádia dospělců.

Proti klíšťatům:

Prevence nových infestací po dobu 4 týdnů.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u koček.

Pro absenci dostupných informací se nedoporučuje používat DUOWIN CONTACT u štěňat mladších 2 měsíců, u zvířat nemocných a v rekonvalescenci a u laktujících fen.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

U některých léčených zvířat se může objevit zvracení, zvýšená salivace a svědění, ale tyto příznaky jsou přechodného charakteru. Po aplikaci přípravku na vlhkou srst se může přechodně objevit bílé zabarvení.

Pokud by se však přesto objevily jakékoliv příznaky intolerance (hyperaesthesia, ataxia, intenzivní erythema, přetrvávající třesot), doporučujeme k eliminaci přípravku umýt psa šamponem.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování je: 0,50ml DUOWINU CONTACT na 1kg ž.hm., což odpovídá 200 mg permethrinu a 1,6 mg pyriproxyfenu na 1 kg ž.hm.

K dosažení této dávky aplikujte:

- malí psi < 7,5 kg ž.hm. : 1 pipeta označená „2 ml“
- středně velcí psi od 7,5 kg do 15 kg ž.hm. : 1 pipeta označená „4 ml“
- velcí psi od 15 kg do 30 kg ž.hm. : 1 pipeta označená „8 ml“
- velmi velcí psi > 30 kg ž.hm. : 2 pipety označené „8 ml“

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

DUOWIN CONTACT by měl být aplikován po linii od kořene ocasu až ke krku.

Manipulujte opatrně s pipetou při kontaktu s kůží. Doporučený interval pro opakování aplikace je 1x měsíčně. Jakmile je srst psa po aplikaci suchá, je bezpečné se zvířete dotýkat.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

Nepoužívejte po ukončení doby použitelnosti uvedené na obalu

Obsah pipety je určen k jednorázové spotřebě.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Jako pro všechny externí insekticidy :

- zabraňte kontaktu s kůží a očima. Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce, případně zasaženou kůži vodou a mýdlem.
- během manipulace s přípravkem nejíst, nepít a nekouřit
- uchovávejte mimo dosah dětí

Nspotřebovaný materiál likvidovat dle platných předpisů o nakládání s odpady. Přípravek je nebezpečný pro ryby a vodní organismy, nekontaminujte rybníky a vodní toky přípravkem nebo prázdnými obaly. Je rovněž toxický pro včely.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechn nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. Přípravek je nebezpečný pro ryby a vodní organismy, nekontaminujte rybníky a vodní toky přípravkem nebo prázdnými obaly. Je rovněž toxický pro včely.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

březen 2008

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.