

PRILOGA III

OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla s 4, 20, 24, 60 ali 120 intramamarnimi injektorji

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

SUPER MASTIDOL DC 1000 mg/314 mg/500 mg intramamarna suspenzija

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak intramamarni injektor (9 g) vsebuje:

Učinkovine:

prokainijev benzilpenicilat monohidrat	1000 mg
kalijev benzilpenicilat	314 mg
neomicinijev sulfat	500 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

Škatla s 4 intramamarnimi injektorji
Škatla z 20 intramamarnimi injektorji
Škatla s 24 intramamarnimi injektorji
Škatla s 60 intramamarnimi injektorji
Škatla s 120 intramamarnimi injektorji

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Krave v presušitvi

5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Intramamarno dajanje.

7. KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 35 dni.

Mleko: Če je presušitev daljša od 35 dni: 2 molži.

Če je presušitev krajša od 35 dni: mleko je potrebno pred oddajo testirati na zaostanke.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi pod 30° C.
Zaščitite pred svetlobo.
Shranjujte na suhem mestu.
Ne zamrzujte.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

VIRBAC

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0321/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Intramamarni injektor

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Super Mastidol DC



2. KOLIČINA UČINKOVIN

10 ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}