

**ETIKETTERING****GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos met 50 ml, 100 ml of 250 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Wellicox 50 mg/ml oplossing voor injectie

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)**

1 ml bevat: 50 mg Flunixin (als meglumine).

**3. VERPAKKINGSGROOTTE**50 ml  
100 ml  
250 ml**4. DOELDIERSOORT(EN)**

Rund, varken en paard

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEG(EN)**Rund/varken: Intramusculair gebruik  
Rund/paard: Intraveneus gebruik**7. WACHTTIJD(EN)**

Wachttijd:

Rund:

Vlees en slachtafval: 10 dagen (IV toediening) / 31 dagen (IM toediening).

Melk: 24 uur (IV toediening) / 36 uur (IM toediening).

Varken:

Vlees en slachtafval: 20 dagen.

Paard:

Vlees en slachtafval: 10 dagen.

Melk: Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/yyyy}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.

**9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Niet bewaren boven 25°C na eerste opening van de primaire verpakking.

**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

**11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

**12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN****14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V437771 (Glazen injectieflacon)  
BE-V574746 (Plastic injectieflacon)

**15. PARTIJNUMMER**


Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN  
MOETEN WORDEN VERMELD**

**Etiket 50 ml**

**1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Wellicox



**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDELEN**

Flunixin 50 mg

**3. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp.

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen, tot \_\_/\_\_/\_\_

**GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Etiket 100 ml of 250 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Wellicox 50 mg/ml oplossing voor injectie

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)**

1 ml bevat 50 mg flunixine (als meglumine).

**3. DOELDIERSOORT(EN)**

Rund, varken en paard

**4. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Rund/varken: IM.

Rund/paard: IV.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

**5. WACHTTIJD(EN)**

Wachttijd:

Rund:

Vlees en slachtafval: 10 dagen (IV toediening) / 31 dagen (IM toediening).

Melk: 24 uur (IV toediening) / 36 uur (IM toediening).

Varken:

Vlees en slachtafval: 20 dagen.

Paard:

Vlees en slachtafval: 10 dagen.

Melk: Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

**6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/yyyy}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.

**7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Niet bewaren boven 25°C na eerste opening van de primaire verpakking.

**8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

**9. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}