

**ANHANG III**  
**KENNZEICHNUNG**

## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Sarnacuran 50%****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

**Sarnacuran 50%, 0,5 g/ml Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut**  
**Lösung**  
(Phoxim)

**2. WIRKSTOFF(E)**

100 ml = 50 g Phoxim

**3. DARREICHUNGSFORM**

Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

250 ml  
*oder*  
1000 ml  
*oder*  
5000 ml

**5. ZIELTIERART(EN)**

Für Schaf und Schwein

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)****7. ART DER ANWENDUNG**

Äußerliche Anwendung  
Wasch-, Sprüh- und Tauchbehandlung.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT(EN)**

Schwein: 9 Tage.  
Schaf: Essbare Gewebe: 42 Tage Nicht verabreichen an Schafe deren Milch zum menschlichen Verzehr bestimmt ist.

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Die Behandlung von Tieren mit Herzkrankheiten, (Broncho)Spasmen oder Tieren mit Leber- oder Nierkrankheiten soll mit äußerster Vorsicht geschehen.

Der direkte Kontakt des Produktes oder der hergestellten Emulsion mit der Haut, den Schleimhäuten und den Augen ist zu vermeiden.

Versehentlich auf die Haut gelangtes Produkt sofort mit Wasser und Seife entfernen.

Wenn das Produkt versehentlich in die Augen gelangt ist, müssen diese sorgfältig mit viel Wasser gespült werden.

Schutzhandschuhe (Einweg-Nitrilhandschuhe), Schutzkleidung (langärmeliges Oberteil, lange Hosen, Gummistiefel und wasserabweisende Schürze) und eine Schutzbrille tragen während der Anwendung des Produktes und bei kürzlich behandelten Schafen.

Versehentlich kontaminierte Kleidung sollte unverzüglich gewechselt werden, nachher diese waschen oder vernichten.

Nebel nicht einatmen.

Bei der Behandlung im Freien darf nicht gegen den Wind gesprüht werden.

Ausschließlich in einem gut gelüfteten Raum anwenden, am liebsten im Freien.

Bei der Anwendung in geschlossenen Räumen sollte eine partikelfiltrierende Halbmaske FFP3 (Schutz gegen Feinstaub und wasserlösliche Aerosole) verwendet werden.

Nicht sprühen in Gegenwart von ungeschützten Personen.

Beim Auftreten von Vergiftungssymptomen unverzüglich einen Arzt konsultieren und die Packungsbeilage vorzeigen, wie bei anderem Organophosphaten.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren

Von Lebensmitteln und Futtermitteln getrennt aufbewahren.

Während der Anwendung nicht rauchen, essen oder trinken. Zuerst das Anwendungsgebiet verlassen und die Schutzkleidung abziehen, Gesicht und Hände sorgfältig waschen. Nach der Anwendung möglichst schnell Hände, Gesicht und Haut waschen.

Die benutzten Geräte sind nach Gebrauch gründlich zu reinigen.

Die Reste des Sprays oder der Badlösung nicht in Wasserläufe, Abflüsse, Abwasserkanal, Abflußrohr und Graben, Brunnen, Dränagerohr fließen lassen.

Leere Verpackungen nicht wiederverwenden.

Hochträchtige Tiere können problemlos mit den empfohlenen Dosen behandelt werden.

Nicht bei Schafen anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Nicht gleichzeitig mit anderen Cholinesterasehemmern anwenden.

Muskelrelaxanzien vom Succinylcholintyp dürfen nur mit einem Intervall von 10 Tagen vor und nach der Behandlung mit Sarnacuran angewendet werden.

Anthelminthika (wie Febantel), die nicht auf Phosphorsäureestern basieren, dürfen jedoch gleichzeitig verabreicht werden

Bei schwerer Vergiftung können, wie mit anderen organischen Phosphorverbindungen, folgende Symptome auftreten: Schwitzen, Durchfall, Krämpfe, Koordinationsstörungen, Atemnot und Bewusstseinsverlust.

Bei Überdosierung muss Atropinsulfat (1 %) I.V. oder I.M. injiziert werden.

Bei schwerer Vergiftung des Tieres muss die Atropindosis zwei- bis dreimal so hoch wie die normale Dosis sein. Wenden Sie sich bei Vergiftung sofort an einen Arzt und zeigen Sie ihm das Etikett des Präparats.

Dosierung: Mensch: 0,2 - 0,5 ml  
Schaf und Schwein: 2,0 - 5,0 ml

Bei Bedarf je nach Besserung der Symptome nach 15 bis 30 Minuten wiederholen.  
Am besten wird auch eine symptomatische Behandlung eingeleitet.

#### **10. VERFALLDATUM**

EXP:

Haltbarkeit des Tierarzneimittels im unversehrten Behältnis: 30 Monate.

Haltbarkeit nach dem erstmaligem Öffnen des Behältnisses: 6 Monate.

Haltbarkeit nach Auflösung gemäß den Anweisungen: 48 Stunden

#### **11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nicht über 25°C lagern.

#### **12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Wasserläufe, Abflüsse, Abwasserkanäle, Abflussrohre, Gräben und andere Gewässer nicht kontaminieren.

Nicht aufgebrauchtes Tierarzneimittel oder Abfallmaterial muß in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften entsorgt werden.

Phoxim ist hochtoxisch für Fische, aquatische Invertebraten, Vögel und Bienen. Es kann langfristige Schäden in Oberflächengewässern verursachen.

#### **13. VERMERK "NUR FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere

Verschreibungspflichtig

#### **14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

#### **15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Elanco Animal Health GmbH  
Alfred-Nobel-Str. 50  
40789 Monheim  
Deutschland

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

BE-V125474

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Lot:

**ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG****Sarnacuran 50%****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

**Sarnacuran 50%, 0,5 g/ml Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut**  
**Lösung**  
(Phoxim)

**2. WIRKSTOFF(E)**

100 ml = 50 g Phoxim

**3. DARREICHUNGSFORM**

Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

250 ml  
*oder*  
1000 ml  
*oder*  
5000 ml

**5. ZIELTIERART(EN)**

Für Schaf und Schwein

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)****7. ART DER ANWENDUNG**

Äußerliche Anwendung  
Wasch-, Sprüh- und Tauchbehandlung.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT(EN)**

Schwein: 9 Tage.  
Schaf: Essbare Gewebe: 42 Tage Nicht verabreichen an Schafe deren Milch zum menschlichen Verzehr bestimmt ist.

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**10. VERFALLDATUM**

EXP:

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nicht über 25°C lagern.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "NUR FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere  
Verschreibungspflichtig

**14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Elanco Animal Health GmbH  
Alfred-Nobel-Str. 50  
40789 Monheim  
Deutschland

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

BE-V125474

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Lot: