

NOTICE**Vetbuton 100 mg/ml solution injectable pour bovins, porcins, équins, ovins et caprins****1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant responsable de la libération des lots:

Vet-Agro Multi-Trade Company Sp. z o.o.
Gliniana 32, 20-616 Lublin
Pologne
Tel. +48 81 44 52 300
Fax +48 81 44 52 320
E-mail: vet-agro@vet-agro.pl

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Vetbuton 100 mg/ml solution injectable pour bovins, porcins, équins, ovins et caprins
Menbutone

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Chaque ml contient:

Substance active:

Menbutone 100,00 mg

Excipients:

Chlorocrésol 2,00 mg

Métabisulfite de sodium (E223) 2,00 mg

Solution limpide jaune verdâtre

4. INDICATION(S)

Stimulation de l'activité hépato-digestive lors de troubles digestifs et d'insuffisance hépatique.

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au substance active ou à l'un des excipients.

Ne pas utiliser chez les animaux cardiaques ou en gestation avancée.

Veillez vous reporter à la section MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S).

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Après administration intraveineuse, une salivation, un larmoiement, des tremblements, une miction spontanée et des selles peuvent survenir. Après administration intramusculaire, une réaction au site d'injection (œdème, hémorragie, nécrose) peut survenir. L'agitation et l'augmentation de la fréquence respiratoire sont observées dans de très rares cas. Dans de rares cas, une décubitanche transitoire peut survenir, en particulier chez les bovins et après une injection intraveineuse rapide.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a été pas efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Bovins, ovins, caprins, équins et porcins.

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Veaux, ovins, caprins et porcins: voie intramusculaire ou intraveineuse.

Bovins: voie intraveineuse.

Chevaux: utilisation lente par voie intraveineuse.

Veaux (jusqu'à 6 mois), ovins, caprins et porcins:

10 mg de ménbutone par kg de poids corporel appliqué soit profondément i.m. ou lentement i.v. équivalent à 1 ml de solution injectable pour 10 kg de poids corporel.

Bovins:

5 à 7,5 mg de ménbutone par kg de poids corporel par voie intraveineuse, soit 1 ml de solution pour injection par 15 à 20 kg de poids corporel.

Les chevaux:

2,5 à 5 mg de ménbutone par kg de poids corporel par voie intraveineuse lente, ce qui équivaut à 1 ml de solution pour injection par 20 à 40 kg de poids corporel.

L'administration peut être répétée une fois si nécessaire après 24 heures.

Ne pas aborder le flacon plus de 125 fois.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Aucune

10. TEMPS D'ATTENTE

Viande et abats: zéro jour

Lait: zéro jour

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conservez le flacon dans l'emballage extérieur de façon à protéger de la lumière.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur l'étiquette après EXP.

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 28 jours

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières pour chaque espèce cible :

Aucune.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :

Pour les chevaux, une administration intraveineuse lente est conseillée.

L'administration par voie intraveineuse doit être faite lentement (pas moins de 1 minute) pour éviter les effets indésirables décrits à la rubrique EFFETS INDÉSIRABLES.

Il est recommandé de ne pas injecter plus de 20 ml par voie intramusculaire sur un site d'application.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :

Une auto-injection accidentelle peut induire des réactions locales.

Les personnes présentant une hypersensibilité connue au menbutone devraient éviter tout contact avec le médicament vétérinaire.

Utilisez une aiguille protégée jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.

En cas d'auto-injection accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette.

Gestation :

Ne pas utiliser pendant le dernier tiers de la gestation.

Lactation :

Le produit peut être utilisé pendant l'allaitement.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions :

Aucune connue.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) :

Aucune connue.

Incompatibilités :

Ne pas mélanger avec d'autres médicaments vétérinaires, en particulier les sels de calcium, la pénicilline procaïne ou les vitamines B.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

Août 2019

15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Taille de l'emballage:

Boîte en carton avec 1 flacon de 100 ml.

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire

BE-V544782