

NAVODILO ZA UPORABO

Toltarox 50 mg/ml, peroralna suspenzija za prašiče

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROŠČANJE SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec odgovoren za sproščanje serij:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Toltarox 50 mg/ml, peroralna suspenzija za prašiče
Toltrazuril

3. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SESTAVIN

1 ml goste bele suspenzije vsebuje 50 mg toltrazurila z 2,1 mg natrijevega benzoata (E211) in 2,1 mg natrijevega propionata (E281).

4. INDIKACIJA(E)

Preprečevanje kliničnih znakov kokcidioze pri novorojenih pujskih (3 do 5 dni) na farmah, na katerih je bila potrjena prisotnost kokcidioze, ki jo povzroča *Isospora suis*.

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabite v primeru preobčutljivosti na zdravilno učinkovino ali na katero koli pomožno snov.

6. NEŽELENI UČINKI

Niso znani.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči (3 – 5 dni stari pujski)

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Vsi pujski prejmejo 3. do 5. dan starosti enkratni peroralni odmerek toltrazurila po 20 mg na kilogram telesne mase, kar ustreza 0,4 ml peroralne suspenzije na kilogram telesne mase.

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Za peroralno uporabo.

Individualno zdravljenje.

Zaradi majhnega volumna, ki je potreben za zdravljenje posameznih pujskov, priporočajo uporabo opreme za odmerjanje z natančnostjo 0,1 ml.

Peroralno suspenzijo je treba pred uporabo pretresti.

Zdravljenje med izbruhom bolezni je omejene vrednosti za posameznega pujska, ker je tanko črevo že poškodovano.

10. KARENCA

Meso in organi: 77 dni.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Za shranjevanje ni posebnih navodil.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini po EXP. Rok uporabnosti zdravila se nanaša na zadnji dan v navedenem mesecu..

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 12 mesecev.

12. POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto

Tako kot pri vseh antiparazitikih se lahko pri pogosti in ponavljajoči se uporabi antiprotozoikov iz iste skupine razvije odpornost.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Niso znane, na primer pri kombinirani uporabi z nadomeščanjem železa ni interakcij.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi) (če je potrebno)

Zdravi pujski so trikratni odmerek prenašali dobro in brez znakov netolerance.

Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti tega zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili za uporabo v veterinarski medicini.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo

Oškropljeno kožo ali oči takoj sprati z vodo.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITEVE NAVODIL ZA UPORABO

31.7.2015

15. DRUGE INFORMACIJE

Toltarox je na voljo v plastenkah po 250 ml in 1000 ml. Plastenka po 250 ml je na voljo v škatli. Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.