

# Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Heimilað

- Ivermectin
- Ivermectin
- Ivermectin

## Auðkenni lyfs

### Heiti lyfs:

Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

### Virkt efni:

Aðeins fáanlegt í [enska](#)

Aðeins fáanlegt í [enska](#)

Aðeins fáanlegt í [enska](#)

### Marktegund:

Nautgripir

Svín

Sauðkind

### Leið stjórnslu:

Til notkunar undir húð

## Upplýsingar um lyf

### Virkt efni og styrkur:

Aðeins fáanlegt í enska  
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Aðeins fáanlegt í enska  
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Aðeins fáanlegt í enska  
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

---

### **Lyfjaform:**

Stungulyf, lausn

---

### **Afurðanýtingafrestur eftir íkomuleið:**

#### **Til notkunar undir húð:**

- 

#### **Nautgripir**

- Kjöt og innmatur. 49 dagar

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/lægning.

- Kjöt og innmatur. 49 dagar

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/lægning.

- Kjöt og innmatur. 49 dagar

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/lægning.

- 

#### **Svín**

- Kjöt og innmatur. 45 dagar

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/lægning.

- Kjöt og innmatur. 45 dagar

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/lægning.

- Kjöt og innmatur. 45 dagar

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

•

### **Sauðkind**

- Kjöt og innmatur. 45 dagar

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Kjöt og innmatur. 45 dagar

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Kjöt og innmatur. 45 dagar

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

---

## **ATC flokkun (dýrallyf) (e. Anatomical therapeutic chemical veterinary - ATC-VET):**

QP54AA01

---

## **Lögformleg staða:**

Ávísunarskylt dýrallyf

---

## **Staða leyfis:**

Gilt

---

## **Heimilað í:**

Danmörk

---

## **Fáanlegt í:**

Danmörk

---

## **Lýsing umbúða:**

Aðeins fáanlegt í danska

Aðeins fáanlegt í danska

Aðeins fáanlegt í danska

---

## Aðrar upplýsingar

**Réttindategund:**

Marketing Authorisation

---

**Lagalegur grundvöllur markaðsleyfis:**

Aðeins fánlegt í [enska](#) [franska](#) [ítalska](#) [lettneska](#) [Norwegian](#)

---

**Markaðsleyfishafi:**

Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

---

**Dagsetning markaðsleyfis:**

8/09/1983

---

**Framleiðslustaður fyrir losun lotu:**

Boehringer Ingelheim Animal Health France

Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

---

**Ábyrgt yfirvald:**

Danish Medicines Agency

---

**Markaðsleyfisnúmer:**

10799

---

**Dagsetning á breytingu stöðu:**

8/09/1983

---

Til að tilkynna upplýsingar um aukaverkanir vegna dýrallyfja vinsamlegast farið á [www.adrreports.eu/vet](http://www.adrreports.eu/vet)

## Skjöl

Samantekt á eiginleikum lyfs

Þetta skjal er ekki til á þessu tungumáli (@Language). Þú getur fundið það á öðru tungumáli hér að neðan.