

## **Příbalová informace**

### **1. Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci a držitele povolení k výrobě odpovědného za uvolnění šarže, pokud se nezhoduje**

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BB Pharma a. s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4, Česká republika

DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Biotika a.s., 976 13 Slovenská Ľupča 566, Slovenská republika

### **2. Název veterinárního léčivého přípravku**

**K E T O B I O N NEO sol. ad us.vet.**

Perorální roztok

### **3. Obsah léčivých a ostatních látek**

1 ml roztoku obsahuje:

Léčivé látky: DL-Hydroxymethioninum 20,0 mg, Cobaltum 22,7 µg (jako Cobaltosi chloridum 50 µg), Amonii propionas 50,0 mg, Propylenglycolum 400,0 mg

Ostatní látky: Melasa 480,0 mg, voda čištěná

### **4. Indikace**

Terapie a prevence subklinických a klinických forem poruch energetického metabolismu přežvýkavců (v průběhu gravidity, v poporodním období a v období nejvyšší užitkovosti - acetonemie dojníc, toxémie gravidních ovcí). Podpurná terapie při poškození jater následkem intoxikací, poruch metabolismu tuků a cukrů, poruchách bachorového trávení (po antibiotické terapii), malnutrici, kachexii, podvýživě, septikemických onemocněních, traumatických poškozeních předžaludků; při výskytu puerperálních komplikací a zhoršených reprodukčních ukazatelích při vysoké užitkovosti.

Doplněk při energetickém deficitu krmných dávek a náhlých změnách krmiva.

### **5. Kontraindikace**

Nejsou známy.

### **6. Nežádoucí účinky**

V průběhu terapie se nepředpokládá žádný negativní účinek na zdravotní stav zvířat, pro který je přípravek určen a vzhledem k tomu, že toxicita kobaltu je nízká a ostatní účinné látky vstupují do metabolismu a mění se na tělu vlastní produkty.

Jestliže zaznamenáte jakékoli závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

### **7. Cílový druh zvířat**

Skot, ovce, kozy.

### **8. Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání**

skot	2 x denně 250 ml	pro toto
ovce, kozy	2 x denně 50 ml	pro toto

Per os (sondou, v krmivu).

### **9. Pokyny pro správné podání**

Lék se podává obvykle 1 týden před porodem a 4-5 týdnů po porodu a v odůvodněných případech se může podávat i delší dobu. U vysokoprodukčních dojníc i při těžkých ketózách je možné dávku po porodu zdvojnásobit.

### **10. Ochranná lhůta**

Bez ochranných lhůt.

### **11. Zvláštní opatření pro uchovávání**

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Uchovávejte v suchu.  
Chraňte před mrazem.  
Po prvním otevření uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

### **Doba použitelnosti**

Doba použitelnosti po prvním otevření 28 dnů.  
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

### **12. Zvláštní upozornění**

V případě zasažení očí proplachujte dostatečným množstvím vody i pod víčky minimálně 15 minut. Při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Při kontaktu substance s kůží se doporučuje postižené místo omýt vodou a mýdlem.

Při náhodném perorálním požití může přípravek vyvolat průjem a podráždění GIT účinkem vysoké salinity a koncentrace jednoduchých cukrů.

V případě komplikací vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

### **13. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu**

Všechny nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

### **14. Datum poslední revize příbalové informace**

Listopad 2016

### **15. Další informace**

#### **Interakce**

Nejsou známy.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

#### **Velikost balení**

500 ml, 2000 ml, 5 l, 10 l, 25 l.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.