

ЛИСТОВКА

Dexamethasone 2 mg/ml/ Дексаметазон 2 mg/ml

Инжекционен разтвор за кучета и котки, 2 mg dexamethasone (as disodium phosphate)/ 1 ml

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Alfasan International B.V.
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
The Netherlands

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Dexamethasone 2 mg/ml/ Дексаметазон 2 mg/ml

Инжекционен разтвор за кучета и котки, 2 mg dexamethasone (as disodium phosphate)/ 1 ml

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всеки ml от разтвора съдържа:

2 mg dexamethasone (as disodium phosphate)

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

- При възпалителни състояния на скелетно-мускулната система, като артрити, тендинити, тендовагинити, синовити;
- Алергични кожни състояния;
- Алергични белодробни състояния, като бронхиална астма;

Дексаметазонът е синтетичен глюкокортикоид със силно противовъзпалително действие. Фармакологичното действие и терапевтичните индикации на активната субстанция са добре познати.

Като поддържаща терапия, дексаметазонът може да се използва за лечение на различни ревматични, алергични, дерматологични заболявания и при болести, за които се знае, че се повлияват от противовъзпалителни кортикостероиди. Разтворът на дексаметазон може да се прилага интравенозно, когато се изисква незабавното му действие.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при следните състояния:

- Вирусни инфекции (през виремичната фаза);
- Захарен диабет;
- Остеопороза;
- Заболявания на сърцето;
- Бъбречни заболявания;
- Гъбични инфекции;
- Язва на роговицата;
- Изгаряния;
- Бременни животни (във високи дози).

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

- Аборт в последната третина от бремеността;
- Намалена резистентност на организма срещу всички патогенни микроорганизми; септицемия и септичен цистит; замаскиране на съществуваща инфекция; имunosupресия;
- При продължителна употреба, адренална супресия с адренална недостатъчност в случаите на негативни въздействия като стрес или внезапно спиране на терапията с продукта;
- Активен катаболизъм, водещ до атрофия на мускулите, миопатия, забавяне на нарастване на раните;

- Остеопороза;
- Инхибиране растежа и удължаване на костите;
- Атрофия на кожата;
- Захарен диабет;
- Полиурия, полидипсия;
- Полифагия;
- Еуфория;
- Язви в стомашно-чревния тракт;
- Панкреатит;
- Хиперлипидемия;
- Увеличена липолиза;
- Масни инфилтрации в черния дроб, като стероидна хепатопатия;
- Инхибиране на хипоталамус-хипофиза-надбъбречна система;
- Намалена синтеза в щитовидната жлеза;
- Увеличавана синтеза в паратироидната жлеза;
- Болест на Къшинг.

Противовъзпалителните кортикостероиди, като дексаметазона предизвикват проява на много и различни неблагоприятни реакции. Обикновено единичната висока доза се понася добре. Продуктът може да предизвика неблагоприятни реакции при продължителна употреба или когато се приложи продукт с удължено действие, съдържащ естери.

Дозата при средна и дълга продължителност на прилагане на продукта трябва да е минимално необходимата, за да се контролират симптомите.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинският продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета и котки.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Да се прилага само по лекарско предписание.

Интрамускулно, интравенозно или интраартикуларно приложение.

Кучета и котки: 0,25 – 2,0 ml.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Продължителната терапия с продукта трябва да се спре постепенно, като се прилагат бавно намаляващи дози от продукта.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява при температура 15- 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да не се замразява или да се съхранява в хладилни условия.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Животните, третирани с кортикостероиди трябва да бъдат под пряко лекарско наблюдение. Поради противовъзпалителния си ефект кортикостероидите скриват симптомите на инфекция и може да се спре третирането, за да се постави по-нататъшна диагноза.

При по-продължителна употреба на продукта, пациентите трябва периодично да бъдат прегледвани от ветеринарен лекар.

Кортикостероидите могат да предизвикат слаба резистентност или да усилят съществуваща инфекция. При наличие на бактериална инфекция, се изисква и употребата на антибактериални продукти и на стероидни противовъзпалителни. При наличие на вирусна инфекция, стероидите могат да влошат или да ускорят процеса на заболяването.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Хора с установена свръхчувствителност към дексаметазон, трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.

Бременност и лактация:

Не се препоръчва прилагането на продукта по време на бременност. Прилагането му в последната третина от бременността може да предизвика аборт.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налични данни.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти:

Няма други странични ефекти, освен описаните в т. 6.

Основни несъвместимости:

Не са известни.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

09/2022

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

Д-Р ИВАН ШИКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР