

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА – КОМБИНИРАН ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА

{5, 10, 20, 60 или 200 литра, полиетиленови варели с висока плътност с винтови капачки от полиетилен с висока плътност }

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Proactive 1.52 mg/ml Разтвор за потапяне/напръскване на папила на млечна жлеза

2. СЪСТАВ

Един ml съдържа:

Активно вещество:

Iodine 1.52 mg

Червенокафява течност.

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

5, 10, 20, 60 или 200 литра

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда (крави за мляко).

5. ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Показания за употреба

Дезинфекция на папилите на млечната жлеза като част от стратегия за намаляване на честотата на мастит при крави в лактационен период (профилактика на мастит).

6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

7. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения

Наличието на мляко или замърсяване неутрализира йода, намалявайки неговата активност и ефективност. Уверете се, че вимето и папилите са чисти и сухи преди следващото доене.

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Само за външна употреба. Използването при наранени папили може да забави процеса на заздравяване на рани. Препоръчва се лечението да се преустанови, докато папилите се излекуват. Оставете ветеринарния лекарствен продукт да изсъхне, преди кравите да бъдат изложени на дъжд, студени или ветровити метеорологични условия.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Хората с установена свръхчувствителност към йод или към някое от помощните вещества трябва да избягват контакт с този ветеринарен лекарствен продукт. Ако развиете симптоми след излагане, като кожен обрив, трябва да потърсите лекарска помощ и да покажете комбинирания листовка и етикет на лекаря. Избягвайте поглъщането на ветеринарния лекарствен продукт. При случайно поглъщане незабавно потърсите лекарска помощ и покажете комбинирания листовка и етикет на лекаря. Не яжте, не пийте и не пушете, докато използвате ветеринарния лекарствен продукт. Когато се използва като спрей, избягвайте да работите в мъглата от спрея. Този ветеринарен лекарствен продукт може леко да дразни кожата и очите. Избягвайте контакт с кожата и очите, когато прилагате ветеринарния лекарствен продукт. По време на нанасяне избягвайте контакт с ръцете или носете защитни ръкавици. Ако ветеринарният лекарствен продукт влезе в контакт с очите, незабавно ги промийте обилно с вода. Измивайте ръцете си след употреба.

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:

Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се използва едновременно с други дезинфектанти или продукти за грижа за папилите.

Основни несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост, този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарни лекарствени продукти или основи или редуциращи вещества.

8. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Неблагоприятни реакции

Не са известни.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в този етикет или мислите, че ветеринарният лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия или на местния му представител, като използвате данните за контакт на този етикет или чрез Вашата национална система за съобщаване (<https://kvmp.bfsa.bg/phv>)

9. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, НАЧИН И МЕТОД НА ПРИЛАГАНЕ

Дозировка за всеки вид животно, начин и метод на прилагане

Прилагане върху папилата на млечна жлеза. Количества за прилагане: 5 ml за крава за едно нанасяне.

10. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

Съвет за правилното прилагане на продукта

Ветеринарният лекарствен продукт е предназначен да се използва за потапяне на папили след доене до два пъти на ден. Продължителността на лечението не е ограничена. Потапайте всяка папила на кравата веднага след доене в чашка за потапяне, съдържаща неразреден ветеринарен лекарствен продукт. Като алтернатива, пръскайте целите папили след всяко доене. Пръскането трябва да се извършва отдолу на папилата. Уверете се, че папилата е покрита до три четвърти от дължината и допълнете чашката за потапяне или контейнер за пръскане, ако е необходимо. Чашката за потапяне или контейнерът за пръскане трябва да се изпразват след всяко доене и да се измиват преди повторна употреба. Уверете се, че вимето и папилите са чисти и сухи преди всяко доене. Ако ветеринарният лекарствен продукт е замръзнал, размразете го в топло помещение и разклатете добре преди употреба.

11. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентни срокове

Месо и вътрешни органи: Нула дни.

Мляко: Нула часове

12. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Съхранявайте изправен и плътно затворен в оригиналния контейнер.

Да не се съхранява при температура над 25 °C.

Да се пази от замръзване.

Да се пази от светлина.

Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикет след Годен до: Exp. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.

13. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ

Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци. Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда. Този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като йодът може да бъде опасен за риби и други водни организми. Попитайте Вашия ветеринарен лекар или фармацевт как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

14. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска без лекарско предписание.

15. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗМЕРИ ОПАКОВКИ

№ 0022-3318

Размери опаковки

Непрозрачен варел от полиетилен с висока плътност с вместимост 5, 10, 20, 60 или 200 литра, с винтови капачки от полиетилен с висока плътност. Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

16. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ЕТИКЕТА

Дата на последната редакция на етикета

30/07/2025

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите.

17. ДАННИ ЗА ВРЪЗКА

Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия, и производител, отговарящ за освобождаването на партиди и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции: DeLaval NV, Industriepark-Drongen 10, 9031 Gent, Белгия. Телефонен номер на PHV: 0032 9 351 24 27.

18. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

19. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

20. СРОК НА ГОДНОСТ

Партиден номер и срок на годност: вижте етикета в горната част на варела.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 1 година.

21. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден номер и срок на годност: вижте етикета в горната част на варела.

30.7.2025 г.

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП

Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV