

**ANHANG III**

**KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE**

**A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****BOX****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Noromectin Injektion, 10 mg/ml, injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Pro ml:

Ivermectin 10mg

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

1 l

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rinder und Schweine.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Subkutane Anwendung.

**Rinder:**

Ausschließlich subkutan: 1 ml/50 kg (200 µg Ivermectin/kg).

**Schweine (junge und ausgewachsene Tiere):**

Ausschließlich subkutan: 1 ml/33 kg (300 µg Ivermectin/kg).

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

**Rinder:**

Essbare Gewebe: 49 Tage.

Nicht anwenden bei Milchkühen während der Laktation bzw. während der Trockenzeit, wenn die Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Nicht anwenden bei Färsen innerhalb von 60 Tagen vor dem Abkalben.

**Schweine:**

Essbare Gewebe: 18 Tage.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Unter 25 °C lagern.

Vor Licht schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON  
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

**14. ZULASSUNGNUMMERN**

BE-V241525

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**

**FLASCHE**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Noromectin Injektion, 10 mg/ml, Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Ivermectin 10 mg/ml

**3. ZIELTIERART(EN)**

Rinder und Schweine.

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Subkutane Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

**Rinder:**

Fleisch und Innereien: 49 Tage.

Nicht anwenden bei Milchkühen während der Laktation bzw. während der Trockenzeit, wenn die Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Nicht anwenden bei Färsen innerhalb von 60 Tagen vor dem Abkalben.

**Schweine:**

Fleisch und Innereien: 18 Tage.

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Unter 25 °C lagern.

Vor Licht schützen.

**8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}