

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG UND ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

250 ml-Durchstechflasche aus Glas mit Gummistopfen
100 ml-Durchstechflasche aus Glas mit Gummistopfen
50 ml-Durchstechflasche aus Glas mit Gummistopfen
25 ml-Durchstechflasche aus Glas mit Gummistopfen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Tilmovet 300 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Tilmicosin 300 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

250 ml
100 ml
50 ml
25 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind und Schaf

5. ANWENDUNGSGBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

NUR ZUR SUBKUTANEN ANWENDUNG.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Sicherheitshinweise für den Anwender:

**DAS INJIZIEREN VON TILMICOSIN BEI MENSCHEN KANN TÖDLICH SEIN
– UM EINE VERSEHENTLICHE SELBSTINJIZIERUNG ZU VERMEIDEN, IST
BEIM UMGANG MIT DEM PRODUKT ÄUSSERSTE VORSICHT GEBOTEN
UND SIND DIE ANWENDUNGSVORSCHRIFTEN SOWIE DIE FOLGENDEN
ANWEISUNGEN GENAUESTENS ZU BEFOLGEN**

- Dieses Tierarzneimittel darf nur von einem Tierarzt verabreicht werden.
- Eine Spritze mit Tierarzneimittel darf niemals mit aufgesteckter Nadel transportiert werden. Die Nadel darf nur mit der Spritze verbunden sein, wenn die Spritze aufgefüllt oder die Injektion verabreicht wird. Darüber hinaus sollten Spritze und Nadel immer getrennt aufbewahrt werden.
- Es darf kein automatisches Injektionsgerät verwendet werden.
- Es sollte sichergestellt werden, dass die Tiere gut fixiert sind, auch die in der näheren Umgebung.
- Bei der Anwendung von Tierarzneimittel sollten Sie niemals alleine arbeiten.
- Bei versehentlicher Selbstinjektion ist UNVERZÜGLICH EIN ARZT ZU RATE ZU ZIEHEN und die Packungsbeilage oder das Etikett vorzuzeigen. Injektionsstelle mit einer Kaltpackung (nicht direkt mit Eis) bedecken.

HINWEISE FÜR DEN ARZT: Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder

Essbare Gewebe: 70 Tage

Milch: 36 Tage

Wenn das Tierarzneimittel an Kühe während der Trockenzeit oder an trächtige Färse verabreicht wird, sollte die Milch bis zu 36 Tage nach der Abkalbung nicht für den menschlichen Konsum verwendet werden.

Schafe

Essbare Gewebe: 42 Tage

Milch: 18 Tage

Wenn das Tierarzneimittel an Auen während der Trockenzeit oder an trächtige Auen verabreicht wird, sollte die Milch bis zu 18 Tage nach der Ablammung nicht für den menschlichen Konsum verwendet werden.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Huvepharma NV

14. ZULASSUNGSNRUMMERN

BE-V553511 (Glastyp I)

BE-V553520 (Glastyp II)

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}