

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja que contiene un vial de 100 ml o 500 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

MULTIMIN Solución Inyectable para Bovino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Zinc: 60 mg (equivalente a 74,68 mg de óxido de zinc)

Manganeso: 10 mg (equivalente a 20,92 mg de carbonato de manganeso)

Cobre: 15 mg (equivalente a 26,09 mg de carbonato de cobre)

Selenio: 5 mg (equivalente a 10,95 mg de selenito de sodio)

3. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml

500 ml

4. ESPECIES DE DESTINO



5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Exclusivamente para uso subcutáneo. No administrar por vía intramuscular.

Posología:

Bovino - Hasta 1 año: 1 ml cada 50 kg

Bovino - De 1 a 2 años: 1 ml cada 75 kg

Bovino - Más de 2 años: 1 ml cada 100 kg

Volumen máximo por punto de inyección: 7 ml.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Carne: 28 días.

Leche: Cero horas.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado, utilizar antes de 28 días. Utilizar antes de ...

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Warburton Technology Limited

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3981 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Vial de 100 ml y 500 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

MULTIMIN Solución Inyectable para Bovino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS


Cada ml contiene:

Zinc: 60 mg (equivalente a 74,68 mg de óxido de zinc)

Manganeso: 10 mg (equivalente a 20,92 mg de carbonato de manganeso)

Cobre: 15 mg (equivalente a 26,09 mg de carbonato de cobre)

Selenio: 5 mg (equivalente a 10,95 mg de selenito de sodio)

3. ESPECIES DE DESTINO**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Exclusivamente para uso subcutáneo. No administrar por vía intramuscular.

Posología:

Bovino - Hasta 1 año: 1 ml cada 50 kg

Bovino - De 1 a 2 años: 1 ml cada 75 kg

Bovino - Más de 2 años: 1 ml cada 100 kg

Volumen máximo por punto de inyección: 7 ml.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Carne: 28 días.

Leche: Cero horas.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado, utilizar antes de 28 días. Utilizar antes de ...

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Warburton Technology Limited

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}