

ЛИСТОВКА :

GALLIMUNE 201 IBD + REO

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба :

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A.
Via Vezza d'Oglio 3,
Milan 20139
Italy

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A
Via Baviera 9
35027 NOVENTA PADOVANA
Italy

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

GALLIMUNE 201 IBD + REO

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

СЪСТАВ НА 1 ДОЗА (0,3 ml):

Активни субстанции:

Инактивиран вирус на инфекциозния бурзит (щам VNJO), минимум титър преди
инактивиране..... $10^{5.7}$ CCID₅₀
Инактивиран птичи реовирус (щам S1133), минимум титър преди
инактивиране..... 10^7 CCID₅₀

Ексципиенти:

Бял течен парафин.....0,208/0,216 ml
Естери на маслени киселини и от полимасло.....0,009/0,016 ml
Естери на маслени киселини и от етоксилани полимасла.....0,0009/0,0045 ml

Тиомерсал..... 0,030 mg
Маслен пълнител до 0,3 ml

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Активна имунизация на родители за бройлери и сточкови носачки срещу инфекциозен бурзит и вирусен артрит по пилетата и за реваксинация след ваксинация с живи такива ваксини.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Не са известни.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Родители за бройлери и стокови носачки.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ

Една доза (0,3 ml) на птица.

Еднократна ваксинация 2 до 4 седмици преди пронасяне.

Прилага се интрамускулно в гръдния мускул или подкожно в ниската дорзална част на шията.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба ваксината да се затопли до стайна температура (+20 °C).

Да се почисти и дезинфектира ваксинационното оборудване.

Да се разклаща енергично флакона с ваксината преди и по време на употреба.

Да не се прилага интравенозно.

Да не се използват спринцовки с бутала от естествен каучук или бутилов еластомер.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C).

Да се пази от замръзване.

Да се пази от светлина.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: използвайте веднага.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Няма.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Да се ваксинират само здрави птици.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Да не се пуши и яде по време на ваксинацията.

Да се мият ръцете след употреба.

За потребителите:

Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Случайното инжектиране/самоинжектиране може да предизвика силна болка и подуване, особено при инжектиране в става или пръст и в редки случаи е възможно да се загуби засегнатия пръст, ако не е оказана навреме лекарска помощ.

Ако по случайност сте инжектирани с този ветеринарномедицински продукт, потърсете спешно съвет от лекар и носете листовката с Вас, дори да е инжектирано съвсем малко количество.

Ако болката продължава повече от 12 часа след медицинския преглед, потърсете отново съвет от лекаря.

За лекарите:

Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Дори да са инжектирани малки количества, случайното инжектиране с този ветеринарномедицински продукт може да предизвика поява на силен оток. При инжектиране в пръста е възможно развитие на исхемична некроза и дори загуба на пръста. Необходима е незабавна, компетентна хирургическа намеса. Възможно е да се наложи инцизия и иригация на инжектираното място, особено, ако са засегнати пулпата на пръста или сухожилието.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Ваксината не се прилага 2 седмици преди и 2 седмици след прилагането на друга ваксина.

Основни несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води. Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

12/2022

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

Република България
„САМ БС“ ЕООД
бул. „д-р Петър Дертлиев“ 25
1335, София
тел: + 359 (02) 8100173
e-mail : sambs@sambs.bg

Д-Р ИВАН ШИКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР