

**PŘÍBALOVÁ INFORMACE**  
PNEUMODOG injekční suspenze

**1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE**

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, Laboratoire Porte des Alpes, rue de l'Aviation, 69800 Saint Priest, Francie

**2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

PNEUMODOG injekční suspenze

**3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK**

1 dávka (1 ml) obsahuje:

**Léčivé látky:**

Bordetella bronchiseptica inactivata.....min. 1,6 log 10\*

Virus parainfluenzae canis inactivatum .....min. 1,6 log 10\*

\* protilátky u vakcinovaných psů

**Pomocné látky:**

Algeldrát

**4. INDIKACE**

Aktivní imunizace psů proti respiračním onemocněním.

Nástup imunity: 14. - 28. den po vakcinaci

Doba trvání imunity: imunita přetrvává po dobu 12 měsíců.

**5. KONTRAINDIKACE**

Nejsou.

**6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Vakcína může ve výjimečných případech způsobit hypersenzitivitu. V takovém případě je třeba přistoupit k symptomatické léčbě. Přítomnost hydroxidu hlinitého může někdy vyvolat v místě podání tvorbu malého a přechodného uzlíku (o průměru  $\leq 3$  cm), který vymizí během 1 nebo 2 týdnů.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

**7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT**

Psi.

**8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ**

1 ml subkutánně nebo intramuskulárně.

## **Vakcinační schéma:**

### Primovakcinace:

Štěňata od vakcinovaných fen: 1 dávka od 6. týdne stáří

Štěňata od nevakcinovaných fen: 1 dávka od 4. týdne stáří

Druhá dávka následuje v obou případech za 2-3 týdny po první dávce.

### Revakcinace:

Každoročně, doporučuje se před přípuštěním a 7 dní před jakýmkoliv kontaktem se skupinou psů.

## **9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ**

Dodržujte běžné zásady asepse. Používejte sterilní injekční materiál, bez obsahu antiseptických a dezinfekčních látek.

## **10. OCHRANNÁ LHŮTA**

Není určeno pro potravinová zvířata.

## **11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte v chladničce (2° C - 8° C). Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Po otevření ihned spotřebujte.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

## **12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Vakcinujte pouze zdravá zvířata, správně odčervena min. 10 dní před vakcinací.

Doporučuje se nevystavovat psy těžké fyzické zátěži do doby, než se plně vyvine imunita.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Březost a laktace:

Lze použít během březosti a laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

## **13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA**

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

## **14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE**

Duben 2020

## **15. DALŠÍ INFORMACE**

Velikost balení: 10 x 1 dávka

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.