| ANCADEN ALIE DED ÄLISSEDEN LIMILIÄL LUNG | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG | | | | | |
| FALTSCHACHTEL | | | | | |
| 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS | | | | | |
| Finadyne Transdermal 50 mg/ml Lösung zum Übergießen für Rinder | | | | | |
| 2. WIRKSTOFF(E) | | | | | |
| Jeder ml enthält 50 mg Flunixin entsprechend 83 mg Flunixin-Meglumin. | | | | | |
| 3. PACKUNGSGRÖSSE(N) | | | | | |
| 100 ml 250 ml 1 L | | | | | |
| 4. ZIELTIERART(EN) | | | | | |
| Rinder | | | | | |
| 5. ANWENDUNGSGEBIETE | | | | | |
| | | | | | |
| 6. ARTEN DER ANWENDUNG | | | | | |
| Zum Übergießen. | | | | | |
| 7. WARTEZEITEN | | | | | |
| Wartezeit(en): Essbare Gewebe: 7 Tage Milch: 36 Stunden | | | | | |
| 8. VERFALLDATUM | | | | | |
| Exp. {MM/JJJJ} Nach Anbrechen innerhalb von 6 Monaten verbrauchen. | | | | | |
| 9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE | | | | | |
| | | | | | |
| 10. VERMERK "LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE." | | | | | |
| Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage. | | | | | |

11. VERMERK "NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN"

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

DE: Intervet Deutschland GmbH

AT: Intervet GesmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: Zul.-Nr. 401983.00.00

AT: Z.Nr. 835578

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

Anwendungshinweise

Bei der Anwendung des Tierarzneimittels sollte eine Schutzausrüstung bestehend aus undurchlässigen Handschuhen, Schutzkleidung und einer geeigneten Schutzbrille getragen werden. Die Aufnahme des Tierarzneimittels kann schädlich sein. Kindern den Zugang zu dem Tierarzneimittel oder damit behandelten Tieren verwehren.

| ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| ETIKETT KUNSTSTOFFFLASCHE 100 ml, 250 ml, 1000 ml | | | | | | |
| 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS | | | | | | |
| Finadyne Transdermal 50 mg/ml Lösung zum Übergießen für Rinder | | | | | | |
| 2. WIRKSTOFF(E) | | | | | | |
| Jeder ml enthält: 50 mg Flunixin (entsprechend 83 mg Flunixin-Meglumin) | | | | | | |
| 3. ZIELTIERART(EN) | | | | | | |
| Rinder | | | | | | |
| 4. ARTEN DER ANWENDUNG | | | | | | |
| Zum Übergießen. Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage. | | | | | | |
| 5. WARTEZEITEN | | | | | | |
| Wartezeit(en): Essbare Gewebe: 7 Tage Milch: 36 Stunden | | | | | | |
| 6. VERFALLDATUM | | | | | | |
| Exp. {MM/JJJJ} Nach Anbrechen verwendbar bis: | | | | | | |
| 7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE | | | | | | |
| | | | | | | |
| 8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS | | | | | | |
| DE: Intervet Deutschland GmbH AT: Intervet GesmbH | | | | | | |
| 9. CHARGENBEZEICHNUNG | | | | | | |
| Lot {Nummer} | | | | | | |