

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/19/0004

Sordex šķīdums infūzijām liellopiem, zirgiem, aitām, cūkām un suņiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

V.M.D. n.v.
Hoge Mauw 900
B-2370 Arendonk
Beļģija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Laboratoires Biove
3 rue de Lorraine
62510 Arques
Francija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Sordex šķīdums infūzijām liellopiem, zirgiem, aitām, cūkām un suņiem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

Glikoze (monohidrāta veidā)	240 mg
Sorbīts	140 mg

Palīgvielas:

Benzilspirts (E 1519), ūdens injekcijām.

Dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Liellopiem, zirgiem, aitām, cūkām, suņiem:

Kaloriju uzņemšanai enerģētiskās vielmaiņas traucējumu gadījumā.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot ūdens aiztures gadījumā.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRKA SUGAS

Liellopi, zirgi, aitas, cūkas, suņi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Lēnai intravenozai ievadīšanai.

Zirgi un pieauguši liellopi: 250 līdz 500 ml.

Kumeļi un teļi: 50 līdz 100 ml.

Aitas un cūkas: 50 līdz 100 ml.

Suņi un sīvēni: 10 līdz 50 ml.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 0 dienas.

Pienam: liellopi, ķēves, aitas: 0 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Hipertoniskais šķīdums var radīt sāpes un kairinājumu injekcijas vietā.

Ievadīt tikai lēni intravenozi!

Sorbīts var saasināt jau esošu acidozi, tāpēc šīs zāles nedrīkst lietot dzīvniekiem ar smagu acidozi.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša pašinjekcija, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Ja notikusi nejauša saskare ar ādu vai nokļūšana acīs, skarto vietu skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Grūsnība un laktācija:

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā.

Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav zināmi.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pārdozēšana var izraisīt hiperhidrāciju ar venozu stāzi un sastrēguma tūskas veidošanos. Var rasties plaušu tūska. Ārstēšana ir simptomātiska.

Nesaderība:
Nav zināma.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

06/2019

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.