

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**Kartonska škatla****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Qivitan LC 75 mg intramamarno mazilo

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En injektor z 8 g vsebuje:

cefkinom 75 mg
(v obliki cefkinomijevega sulfata)**3. VELIKOST PAKIRANJA**3 injektorji po 8 g
12 injektorjev po 8 g
24 injektorjev po 8 g
36 injektorjev po 8 g**4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Govedo (krave v laktaciji)

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Intramamarna uporaba

7. KARENCAKarenca:
Meso in organi: 4 dni
Mleko: 5 dni (120 ur).**8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mm/llll}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Industrial Veterinaria, S.A.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0557/002

15. ŠTEVILKA SERIJE

Serijska številka {številka}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

Injektor

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Qivitan LC 75 mg

2. KOLIČINA UČINKOVIN

En injektor z 8 g vsebuje:

cefkinom 75 mg
(v obliki cefkinomijevega sulfata)

3. KARENCA

Karenca:
Meso in organi: 4 dni
Mleko: 5 dni (120 ur).

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}

5. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}