

B. PACKUNGSBEILAGE

**GEBRAUCHSINFORMATION
PREVENDER GROSSER HUND**

**1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS UND, WENN
UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE
VERANTWORTLICH IST**

Zulassungsinhaber und Hersteller, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist:

VIRBAC

1ère Avenue - 2065 m L.I.D.

06516 CARROS

France

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

PREVENDER GROSSER HUND, Halsband

Dimpylate

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Pro Halsband:

Wirkstoff :

Dimpylate 6,3 g (=15%)

Sonstige Bestandteile :

Calciumcarbonat

Calciumstearat

Epoxydierte sojaöl

Diisobutyladipat

Calcium-Zink Komplex LN 193

Polyvinylchlorid

Farbstoff

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Kur- und Präventivbehandlung von Floh- und Zeckenbefall während 150 Tagen.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht verabreichen an Hunde jünger als 3 Monate.

6. NEBENWIRKUNGEN

Das Tragen des Halsbandes führt zu einer Senkung des Plasma-Cholinesterase-Spiegels, ohne das Tier zu gefährden. Diese Rate beginnt zu steigen, sobald der Kragen entfernt wird.

Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind folgendermaßen definiert:

- Sehr häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen Nebenwirkungen)
- Häufig (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 behandelten Tieren)
- Gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 10 von 1000 behandelten Tieren)
- Selten (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10.000 behandelten Tieren)
- Sehr selten (weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren, einschließlich Einzelfallberichte).>

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Hunde

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Ein Halsband pro Tier von mindestens 20 kg verwenden.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Das Halsband so am Hals des Hundes befestigen, dass man noch zwei Finger zwischen das Halsband und den Hals des Hundes stecken kann. Das überflüssige Halsband abschneiden und in den Abfall werfen.

10. WARTEZEIT

Nicht zutreffend.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25°C lagern.in der Originalpackung.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Beutel angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Keine

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

- Nach Befestigung des Halsbands am Hals des Tieres die Hände waschen.
- Während der Handhabung des Halsbandes nicht rauchen, essen oder trinken.
- Direkten Hautkontakt vermeiden.
- Halsband von Lebensmittel, Trinken und Futter fernhalten.
- Verbieten Sie Kindern, mit dem Halsband zu spielen oder es in den Mund zu nehmen.
- Bis zur Verwendung das Halsband im Umschlag belassen.
- Überstehenden Rest des Halsbandes sofort abschneiden.
- Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Dimpylate oder einem der übrigen Bestandteile sollten den Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden.
- Direkter Kontakt mit behandelten Tieren sollte für mindestens 12 Stunden nach der Behandlung vermieden werden. Am Tag der Behandlung dürfen behandelte Tiere nicht mit ihrem Besitzer schlafen, insbesondere Kinder.

Trächtigkeit und Laktation:

Nicht während der Trächtigkeit verabreichen.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Zur Vorsorge ist es ratsam, das Halsband 24 bis 48 Stunden vor jeder Anästhesie zu entfernen. Keine anderen Insektizide (Organophosphate oder Karbamate) gleichzeitig mit dem Halsband verwenden.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel):

Die Symptome der Intoxikation sind Dyspnoe, erhöhte Speichelabsonderung und Steife der Gliedmassen mit darauffolgendem Mangel an motorischer Koordination.

Als Antidot wird in diesem Fall Atropinsulfat intravenös oder subkutan in einer Dosis von 0,1 mg/kg verabreicht. Weitere Dosen können in Abhängigkeit von den Intoxikationserscheinungen verabreicht werden.

Eine Toleranzstudie über 11 Monate an Hunden, die je bis zu 5 Halsbänder tragen, zeigt keine klinischen Unverträglichkeitsreaktionen auf die Halsbänder.

Inkompatibilitäten:

Keine bekannt

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den lokal Vorschriften zu entsorgen.

Nicht verbrennen

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

September 2019

15. WEITERE ANGABEN

BE-V160553

Beutel mit 1 Halsband von 42 g (ca. 70 cm lang).

Rezeptfreie Abgabe