

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE IMMÉDIAT - ÉTIQUETTE ET NOTICE COMBINÉS

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU FABRICANT RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS SI DIFFÉRENTS

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et le fabricant responsable de la libération des lots:
CID LINES
Waterpoortstraat 2
8900 Ieper
Belgique

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

KENOLAC Spray en Dip 36mg/mL, solution de trempage/pulvérisation des trayons pour les vaches laitières.
acide lactique

3. Déclaration des substances actives <et autre(s) ingrédient(s)>

Une dose de 5 mL de KENOLAC Spray en Dip contient :

Substance active:

Acide lactique 180 mg

Excipients:

Tartrazine (E102) 6 mg

4. FORME PHARMACEUTIQUES

Solution de trempage/ pulvérisation des trayons
Solution liquide jaune

5. EMBALLAGES

1L, 5L, 10L, 20L, 25L, 60L, 200L, 600L.

6. INDICATION(S)

Désinfection des trayons dans le cadre d'une stratégie de prévention des mammites des vaches laitières

7. CONTRE-INDICATIONS

A ne pas utiliser lors d'hypersensibilité connue à l'acide lactique ou à l'un des autres ingrédients.
Ne pas utiliser le produit pour le nettoyage et/ou la désinfection de la machine à traire.

8. EFFETS INDESIRABLES

Aucun connu.

Si vous remarquez des effets indésirables, même s'ils ne figurent pas sur l'étiquette, ou si vous pensez que le médicament n'est pas efficace, vous êtes prié d'en informer votre vétérinaire.

9. ESPECE CIBLE

Bovins (vaches laitières)

10. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE CIBLE, VOIE D'ADMINISTRATION ET MODE

Le produit est prêt à l'emploi pour le trempage ou la pulvérisation des trayons après la traite, au maximum 2 fois par jour.

Utiliser un minimum de 5 mL par vache et par application.

Tremper les trayons immédiatement après la traite. S'assurer que les trois-quarts du trayon soient couverts. Une autre utilisation possible est d'appliquer le produit en couvrant totalement le trayon par pulvérisation immédiatement après la traite.

Système de pulvérisation automatique: ajuster le réglage du robot de sorte que les trayons soient totalement couverts pendant la pulvérisation.

S'assurer que le produit reste 5 minutes sur le trayon.

Le gobelet de trempage ou le pulvérisateur doit être suffisamment rempli.

Si un système d'application avec une solution partagée est utilisé, il est recommandé de renouveler la solution à chaque traite. Le gobelet ou le pulvérisateur doit être vidé, nettoyé et rincé après chaque traite ou lorsqu'il a été contaminé durant la traite.

Ne pas remettre la solution restante dans l'emballage d'origine.

12. TEMPS D'ATTENTE

Viande : Zéro jour

Lait : Zéro heure

13. PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Conserver dans le conditionnement original soigneusement fermé.

Conserver à l'abri de la lumière.

Ne pas utiliser après la date d'expiration située sur l'étiquette.

14. PRECAUTIONS PARTICULIERES

Mise en garde spéciale pour chaque espèce cible:

La présence de matière organique (pus, sang, etc.) peut limiter l'activité désinfectante de l'acide lactique.

Précautions particulières d'emploi chez les animaux :

Si des signes de maladies apparaissent ou persistent, consulter votre vétérinaire.

Pour un usage externe uniquement. Avant la traite, selon les bonnes procédures d'hygiène, nettoyer soigneusement les trayons avec du papier, de l'eau ou un produit homologué pour la préparation des trayons.

Lors de température en dessous de zéro, laisser sécher les trayons avant de faire sortir les vaches.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux :

Eviter le contact avec les yeux. En cas de projection dans les yeux, rincer immédiatement à l'eau courante et consulter votre médecin.

En cas d'ingestion, boire de grandes quantités d'eau et demander l'avis de votre médecin.

Conserver à l'écart des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Se laver les mains après utilisation.

Etant donné que les voies respiratoires sont exposées lors de l'utilisation sous forme de spray, le produit ne doit pas être utilisé par des personnes hypersensibles à l'acide lactique ou à d'autres ingrédients du produit.

Eviter de travailler dans le brouillard de pulvérisation lorsque vous utilisez le produit en spray. La zone de travail ne doit pas être fermée et le système de ventilation doit être suffisant.

Lactation et gestation :

Le produit peut être utilisé en période de lactation et de gestation.

Interaction avec d'autres médicaments et autres formes d'interaction :

Aucune connue

Surdosage (symptômes, procédures d'urgence, antidote) :

N'est pas applicable. Ce médicament vétérinaire est recommandé pour l'usage externe et aucune absorption significative ne survient.

Incompatibilités :

L'acide lactique peut être inactivé par les surfactants ioniques et anioniques (par exemple les savons, même naturels) ou des anions inorganiques. Il est donc déconseillé de mélanger avec l'eau du robinet, ou avec d'autres produits chimiques, des désinfectants ou d'autres produits pour les trayons ou pour le soin du pis.

15. Précautions particulières d'élimination des médicaments vétérinaires non utilisés ou de tout déchet

Les médicaments vétérinaires non utilisés ou les restes doivent être éliminés conformément aux exigences locales. Le médicament vétérinaire ne doit pas être rejeté dans les eaux de surface car cela peut être dangereux pour les poissons et autres organismes aquatiques.

16. Date de la dernière révision de l'étiquette

Novembre 2020

17. Autres informations

1L, 5L, 10L, 20L, 25L, 60L, 200L, 600L.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

18. MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT
--

Pour usage vétérinaire uniquement.

19. MENTION « GARDER HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »
--

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

20. DATE LIMITE D'UTILISATION

Date limite d'utilisation : ____/____/____
A utiliser dans les 6 mois après ouverture.

21. NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

BE-V575031

12. NUMERO DE LOT DU FABRICANT

Lot