

**PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI****Škatla****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Albiotic intramamarna raztopina za krave v laktaciji

**2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)**

10 ml sterilne intramamarne raztopine (en injektor) vsebuje:

**Učinkovine:**

linkomicin (v obliki linkomicinijevega klorida)	330 mg
neomicin (v obliki neomicinijevega sulfata)	100 mg

**Pomožne snovi:**

dinatrijev edetat	5 mg
-------------------	------

**3. FARMACEVTSKA OBLIKA**

Intramamarna raztopina.

**4. VELIKOST PAKIRANJA**

Škatla z 20 polietilenskimi injektorji s po 10 ml.

Škatla s 24 polietilenskimi injektorji s po 10 ml.

Škatla s 96 polietilenskimi injektorji s po 10 ml.

**5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Govedo (krave v laktaciji).

**6. INDIKACIJA(E)**

Zdravljenje mastitisa pri kravah v obdobju laktacije.

**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Intramamarno dajanje.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**8. KARENCA**

Karenca:

Mleko: 84 ur.

Meso in organi: 3 dni.

**9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

EXP {mesec/leto}

**11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

Ne shranjujte pri temperaturi nad 30 °C. Zaščitite pred zamrznitvijo.

**12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO**

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

**13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO**

Samo za živali. Rp-Vet.

**14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

**15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM**

Huvepharma NV, Uitbreidingsstraat 80, 2600 Antwerp, Belgija

**16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

NP/V/0188/001

**17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE**

Serijska

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH**

Intramamarni injektor

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Albiotic intramamarna raztopina za krave v laktaciji

**2. KOLIČINA UČINKOVIN(E)**

linkomicin v obliki linkomicinijevega klorida	330 mg
neomicin v obliki neomicinijevega sulfata	100 mg

**3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV**

10 ml

**4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA**

I/MAM

**5. KARENCA**

Karenca:  
Mleko: 84 ur.  
Meso in organi: 3 dni.

**6. ŠTEVILKA SERIJE**

Serija

**7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

EXP {mesec/leto}

**8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"**

Samo za živali. Rp-Vet.