

*L'information de la notice se retrouve sur l'étiquette.*

## NOTICE

### **Panacur 4% Premix 40mg/g, prémélange médicamenteux pour porcs**

#### **1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

Intervet International B.V. - Boxmeer - Pays-Bas représenté par:  
MSD Animal Health BV/SRL – Clos du Lynx 5 – 1200 Bruxelles

Fabricants responsable de la libération des lots:

Intervet Productions S.A. - Rue De Lyons – 27460 Igoville – France  
Intervet GesmbH - Siemensstrasse 107 - 1210 Vienne – Autriche

#### **2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Panacur 4 % Premix, 40mg/g, prémélange médicamenteux pour porcs

#### **3. LISTE DE LA SUBSTANCE ACTIVE ET AUTRES INGRÉDIENTS**

Fenbendazolum 40 mg, Calcii carbonas, Maydis amylum, Lactosum, Silicii dioxydum coll. q.s.  
ad 1 g.

#### **4. INDICATION(S)**

Pour le traitement des porcs infectés par des stades immatures et adultes des nématodes dans les systèmes gastro-intestinal, respiratoire et rénal, tels que des infestations de *Hyostrogylus rubidus* (*Hyostrogyllose gastrique*), stade adulte; *Oesophagostomum dentatum*, *Oesophagostomum quadrispinulatum* (vers nodulaires), stade adulte; *Ascaris suum*, stade adulte, stade larvaire intestinal et migratoire; *Trichuris suis* (trichures), stade adulte et *Metastrongylus elongatus* (vers pulmonaires), stade adulte.

#### **5. CONTRE-INDICATIONS**

Aucune.

#### **6. EFFETS INDÉSIRABLES**

Aucun, pour autant que connu.

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a été pas efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

#### **7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)**

Porcs.

## 8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION

La dose standard est de 5 mg de fenbendazole (FBZ) par kg de poids vif (PV). Cette dose peut être administrée en une fois, mais de préférence la dose de 5 mg FBZ/kg PV est répartie sur une période de 5-15 jours.

Le traitement des infestations de *Trichuris suis* et *Metastrongylus* spp doit être réparti sur une période de 5-15 jours.

Le Panacur 4% Premix convient pour un traitement de masse chez des porcs ou au traitement individuel des porcs.

Le Panacur 4% Premix est administré aux animaux avec la nourriture habituelle.

### 1. Administration d'une dose thérapeutique unique:

*Traitement individuel unique:* 2, 5 g Panacur 4% Premix par 20 kg PV.

*Traitement de masse:* la dose thérapeutique de 5 mg FBZ/kg PV est mélangée à la ration alimentaire journalière.

Exemple:

| Type de porc                                         | Durée de traitement | Consommation alimentaire | Panacur 4% Premix par tonne d'aliment |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| porcelets sevrés / porcs charcutiers<br>ca. 20 kg PV | 1 jour              | 1 kg/jour/animal         | 2, 5 kg                               |
| Truies<br>ca. 200 kg PV                              | 1 jour              | 2 kg/jour/animal         | 12, 5 kg                              |

### 2. Répartition de la dose thérapeutique sur 5-15 jours:

La dose thérapeutique de 5 mg FBZ/kg PV est mélangée à la ration alimentaire adaptée pendant 5-15 jours.

Exemple:

| Type de porc                                         | Durée de traitement | Consommation alimentaire | Panacur 4% Premix par tonne d'aliment |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| porcelets sevrés / porcs charcutiers<br>ca. 20 kg PV | 5 jours             | 1 kg/jour/animal         | 0, 5 kg                               |
|                                                      | 10 jours            |                          | 0, 25 kg                              |
|                                                      | 15 jours            |                          | 0, 17 kg                              |
| Truies<br>ca. 200 kg PV                              | 5 jours             | 2 kg/jour/animal         | 2, 5 kg                               |
|                                                      | 10 jours            |                          | 1, 25 kg                              |
|                                                      | 15 jours            |                          | 0, 83 kg                              |

## 9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Afin d'assurer un dosage correct, le poids vif doit être déterminé aussi précisément que possible. Pour le traitement d'un groupe d'animaux de même âge ou similaire, le dosage doit être basé sur les animaux les plus lourds du groupe.

## 10. TEMPS D'ATTENTE

Viande et abats: 5 jours après la dernière administration.

## 11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver en dessous de 25 °C.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas conserver après première ouverture.

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente: 3 ans.

Le produit reste stable dans la nourriture préparée pendant 15 jours.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur le sac après EXP.

## 12. MISES EN GARDE PARTICULIÈRES

Précautions particulières pour chaque espèce cible :

La résistance de parasites vis-à-vis d'une classe spécifique d'anthelminthiques, peut se développer suite à l'utilisation fréquente et répétée d'anthelminthiques de cette classe.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :

Tout contact direct avec la peau doit être limité à son minimum.

Gestation et lactation :

Panacur 4% Premix peut être utilisé au cours de chaque stade de la gravidité et de la lactation.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions :

L'administration du Panacur 4% Premix est compatible avec des vaccinations et des traitements simultanés, par exemple aux antibiotiques.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) :

Le Panacur 4% Premix est caractérisé par une marge de sécurité très élevée chez les porcs (1000 x la dose thérapeutique).

## 13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

## 14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

Octobre 2020

## 15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Boîte contenant une poche en polyéthylène de 25 kg.

Délivrance seulement au détenteur de l'autorisation de fabrication des aliments médicamenteux des animaux

**Mode de délivrance:** Sur ordonnance vétérinaire

**Numéro d'enregistrement:** BE-V362275