

PRILOGA III

OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla 100 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Bisolvon 3mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

bromheksinijev klorid 3 mg/ml

3. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči, psi in mačke.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Intramuskularna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7. KARENCA

Karenca:

Govedo: meso in organi: 3 dni.

Prašiči: meso in organi: 2 dni.

Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi pod 8 °C.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0040/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

100 ml viala

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Bisolvon 3mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

bromheksinijev klorid 3 mg/ml

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči, psi in mačke.

4. POTI UPORABE

Intramuskularna uporaba.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Govedo: meso in organi: 3 dni.

Prašiči: meso in organi: 2 dni.

Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi pod 8 °C.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}