

1. Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci a držitele povolení k výrobě odpovědného za uvolnění šarže, pokud se nezhoduje

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
BB Pharma a. s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4, Česká republika

DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE
Biotika a.s., 976 13 Slovenská Ľupča 566, Slovenská republika

2. Název veterinárního léčivého přípravku

K E T O B I O N NEO sol. ad us.vet.

Perorální roztok

5 l (10 l, 25 l)

3. Obsah léčivých a ostatních látek

1 ml roztoku obsahuje

Léčivé látky: DL-Hydroxymethioninum 20,0 mg, Cobaltum 22,7 µg (jako Cobaltosi chloridum 50 µg), Amonii propionas 50,0 mg, Propylenglycolum 400,0 mg

Pomocné látky: Melasa 480,0 mg

4. Indikace

Terapie a prevence subklinických a klinických forem poruch energetického metabolismu přežvýkavců (v průběhu gravidity, v poporodním období a v období nejvyšší užitkovosti - acetonemie dojníc, toxémie gravidních ovcí). Podpůrná terapie při poškození jater následkem intoxikací, poruch metabolismu tuků a cukrů, poruchách bачorového trávení (po antibiotické terapii), malnutrici, kachexii, podvýživě, septikemických onemocněních, traumatických poškozeních předžaludků; při výskytu puerperálních komplikací a zhoršených reprodukčních ukazatelích při vysoké užitkovosti.

Doplněk při energetickém deficitu krmných dávek a náhlých změnách krmiva.

5. Kontraindikace

Nejsou známy.

6. Nežádoucí účinky

Nejsou známy.

7. Cílový druh zvířat

Skot, ovce, kozy.

8. Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání

skot	2 x denně 250 ml	pro toto
ovce, kozy	2 x denně 50 ml	pro toto

Per os (sondou, v krmivu).

9. Pokyny pro správné podání

Lék se podává obvykle 1 týden před porodem a 4-5 týdnů po porodu a v odůvodněných případech se může podávat i delší dobu. U vysokoprodukčních dojníc i při těžkých ketózách je možné dávku po porodu zdvojnásobit.

10. Ochranná lhůta

Bez ochranných lhůt.

11. Zvláštní opatření pro uchování

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před mrazem.

Po prvním otevření uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti po 1. otevření 28 dní.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12. Zvláštní upozornění

V případě zasažení očí proplachujte dostatečným množstvím vody i pod víčky minimálně 15 minut. Při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Při kontaktu substance s kůží se doporučuje postižené místo omýt vodou a mýdlem.

Při náhodném perorálním požití může přípravek vyvolat průjem a podráždění GIT účinkem vysoké salinity a koncentrace jednoduchých cukrů.

V případě komplikací vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. Datum poslední revize příbalové informace

Listopad 2016

15. Další informace

Interakce

Nejsou známy.

POUZE PRO ZVÍŘATA!

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení

500 ml, 2000 ml, 5 l, 10 l, 25 l.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Registrační číslo

96/086/01-C

Číslo šarže:

EXP: měsíc/rok

Po 1. otevření spotřebujte do: