

## ЛИСТОВКА

### 1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

Тилофарм водоразтворим прах  
Tylofarm Water soluble powder  
Праха за прилагане във вода за пиене за птици и свине

### 2. Състав

В 100 g се съдържат:

**Активно вещество:**

Tylosin tartrate 50 g

**Помощно вещество:**

Dextrose monohydrate

### 3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Птици и свине.

### 4. Показания за употреба

Лечение на инфекции на респираторния и гастроинтестиналния тракт, причинени от микроорганизми, чувствителни към тилозин, а именно: стрептококи, стафилококи, коринебактерии, причинителя на червенката, лептоспири и някои щамове бруцели.

За информацията относно дизентерия при свинете виж точка 6.

### 5. Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към активното вещество или към помощното вещество.

### 6. Специални предупреждения

Специални предупреждения:

Употребата на ветеринарния лекарствен продукт трябва внимателно да се обмисли, когато тестът за чувствителност е показал резистентност към макролиди, тъй като неговата ефикасност може да бъде намалена.

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Водата трябва да се подменя на 24 часа.

При промяна в количеството на консумираната вода за пиене, концентрацията на тилозин тартарат трябва да се коригира.

При европейските щамове на *Brachyspira hyodysenteria* е доказан висок процент на *in vitro* резистентност, което означава, че продуктът няма да бъде достатъчно ефикасен срещу дизентерия при свинете.

Употребата на ветеринарния лекарствен продукт трябва да се основава на идентифициране и тестване за чувствителност на целвите бактерии. Ако това не е възможно, терапията трябва да се основава на епидемиологична информация и чувствителността на целвите бактерии на ниво ферма или на местно/регионално ниво. Употребата на ветеринарния лекарствен продукт трябва да бъде в съответствие с официалните, национални и регионални антиминокробни политики.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Хора с установена свръхчувствителност към тилозин тартарат трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт.

Да не се яде, пие и пуши при работа с продукта.

Бременност и лактация:

Не се препоръчва прилагането му по време на бременност и лактация.

Птици носачки:

Да не се използва при птици в периода на яйценосене.

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:

Съвместим с тетрациклини, еритромицин, спектиномицин и сулфонамиди.

Предозиране:

Съществуват данни, че след предозиране при прасета, е възможно да настъпи шок и смърт. Лечението е симптоматично.

Основни несъвместимости:

Глозинът е термостабилен, но в разтвори е чувствителен към действието на светлината и се разгражда.

## **7. Неблагоприятни реакции**

Не са наблюдавани.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: <https://kvmp.bfsa.bg/phv>.

## **8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение**

Перорално приложение във вода за пиене, като единствена вода за пиене.

Птици: 5.0 g в 4 L вода за пиене в продължение на 3-5 последователни дни.

Свине: 2.5 g в 4 L вода за пиене в продължение на 3-5 последователни дни.

## **9. Съвети за правилното прилагане на продукта**

Моля, вижте т.8.



**16. Данни за връзка**

Притежател на разрешението за търговия и производител, отговарящ за освобождаването на партиди и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

“Фарма Вет” ООД  
гр. Шумен, ул. ”Отец Паисий” № 40  
Република България  
тел./факс: 054/801-215  
E-mail: farma\_vet@abv.bg

X

---

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ  
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР