

[Version 9.1, 11/2024]

I PRIEDAS
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Avishield IB QX, liofilizatas akių ir nosies suspensijai ar naudoti su geriamuoju vandeniu vištomis

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje dozėje yra:

veikliosios medžiagos:

gyvo QX tipo 1285 padermės paukščių infekcinio bronchito viruso $10^{3,7} - 10^{5,3}$ EID₅₀*,

* EID₅₀=50 % embrionų užkrečianti dozė (viruso titras, kuris 50 % užkrėstų embrionų sukelia infekciją)

pagalbinių medžiagų:

Kokybinė pagalbinių medžiagų ir kitų sudedamųjų medžiagų sudėtis
Povidonas K 25
Baktopeptonas
Mononatrio glutamatas
Kalio divandenilio fosfatas
Kalio hidroksidas
Dekstranas 40 000

Nuo kreminės iki geltonos spalvos liofilizatas.

3. KLINIKINĖ INFORMACIJA

3.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Vištos.

3.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Vištomis (broileriams, būsimoms dedeklėms ir veislinėms vištaitėms) aktyviai imunizuoti, siekiant sumažinti kvėpavimo sutrikimo požymius dėl paukščių infekcinio bronchito, kurį sukelia į QX panašūs infekcinio bronchito viruso (IBV) variantai.

Imuniteto pradžia: 3 sav. po vakcinacijos.

Imuniteto trukmė: 10 sav. po vakcinacijos.

3.3. Kontraindikacijos

Nėra.

3.4. Specialieji įspėjimai

Vakcinuoti tik sveikus gyvūnus.

3.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims

Visi vieno būrio paukščiai turi būti vakcinuojami vienu metu.

Vakcinuoti viščiukai gali išskirti vakcininės padermės mikroorganizmus ne mažiau kaip 28 d. po vakcinacijos. Tuo metu reikėtų vengti silpno imuniteto ar nevakcinuotų viščių sąlyčio su vakcinuotais.

Norint išvengti vakcininės padermės mikroorganizmų išplitimo tarp imlių rūšių gyvūnų, reikėtų taikyti atitinkamas veterinarines ir gyvūnų laikymo priemones.

Avishield IB QX vakcina skirta apsaugoti viščiukus tik nuo kvėpavimo takų ligos požymių, kuriuos sukelia IBV ir QX panašios padermės, ir neturėtų būti naudojama kaip kitų IBV vakcinų pakaitalas. Reikia užtikrinti, kad vakcinos padermė nepatektų į teritoriją, kurioje jos nėra.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Šią vakciną ruošti ir naudoti reikia atsargiai. Panaudojus vakciną, reikia nusiplauti ir dezinfekuoti rankas bei įrangą, kad būtų išvengta viruso plitimo. Purškiant vakciną, operatorius ir darbuotojai turi dėvėti asmenines apsaugos priemones, kurias sudaro kaukė su akių apsauga.

Specialiosios aplinkos apsaugos atsargumo priemonės

Netaikytinos.

3.6. Nepageidaujami reiškiniai

Vištos

Dažna (1–10 gyvūnų iš 100 gydytų gyvūnų)	Čiaudėjimas.*
---	---------------

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamus reiškinius. Tai leidžia nuolat stebėti veterinarinio vaisto saugumą. Pranešimus, pageidautina, turėtų siųsti veterinarijos gydytojas registruotojui arba jo vietiniam atstovui arba nacionalinei kompetentingai institucijai per nacionalinę pranešimų teikimo sistemą. Taip pat žr. atitinkamus kontaktinius duomenis pakuotės lapelyje.

3.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Dedantys kiaušinius paukščiai

Negalima naudoti paukščiams kiaušinių dėjimo metu ir 4 sav. iki kiaušinių dėjimo pradžios.

3.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad šią vakciną galima maišyti ir naudoti purškiant kartu su vakcinomis Avishield IB H120 ir Avishield IB GI-13. Prieš naudojimą reikia perskaityti šių dviejų vakcinų pakuotės lapelius.

Sumaišytų vakcinų saugumo rodikliai nesiskiria nuo tų, kurie nustatyti atskirai naudojamoms vakcinoms.

Imuniteto pradžia panaudojus sumaišytas vakcinas, yra 3 savaitės, o imuniteto trukmė – 8 savaitės Avishield IB H120 ir Avishield IB GI-13, ir 10 savaičių Avishield IB QX.

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą naudojant su kitu veterinariniu vaistu, išskyrus aukščiau paminėtus vaistus. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

3.9. Dozės ir naudojimo būdas

Naudoti purškiant stambiais lašais ar lašinant į akis ar šnerves – nuo 1 d. amžiaus.

Naudoti su geriamuoju vandeniu – nuo 7 d. amžiaus.

Vakcina turi būti skiriama po vieną dozę kiekvienam paukščiui purškiant stambiais lašais, lašinant į akis ar šnerves arba su geriamuoju vandeniu. Jei viščiukų skaičius yra tarp standartinių dozių, reikia naudoti artimiausią didesnę dozę.

Praskiedus, vakcina atrodo kaip skaidri ar šiek tiek opalescuojanti suspensija.

1. Naudojimas purškiant stambiais lašais

Rekomenduojama 1 000 dozių vakcinos skiesti 150–300 ml distiliuoto vandens. Naudotinių dozių skaičius atitinka paukščių skaičių pulke.

Skiedimui naudojamo vandens kiekis turi būti pakankamas, kad būtų užtikrintas tolygus paskleidimas purškiant ant paukščių, ir priklauso nuo vakcinuojamų paukščių amžiaus ir laikymo sistemos, tačiau 1 000 dozių siūloma naudoti ne mažiau kaip 150–300 ml vandens.

Paruošta vakcinos suspensija turi būti tolygiai purškiama ant atitinkamo skaičiaus viščiukų 30–40 cm atstumu stambiais lašais (tikslinis vidutinis lašelio dydis – 150–170 mikrometrų), geriausia tuomet, kai viščiukai tupi kartu esant silpnam apšvietimui. Purškimo aparatas turi būti be nuosėdų, korozijos ir dezinfekantų likučių ir geriausia, kad jis būtų naudojamas tik vakcinacijai. Vakcinacijos metu ir po jos ventiliacija turėtų būti išjungta, kad būtų išvengta oro turbulencijos.

Maišant šią vakciną su Avishield IB H120 ir Avishield IB GI-13, reikia naudoti tokį patį bendrą vandens kiekį kaip ir naudojant ją vieną. Pavyzdžiui, 1 000 dozių Avishield IB QX, 1 000 dozių Avishield IB H120 ir 1 000 dozių Avishield IB GI-13 turi būti atskiestos bendrai 150–300 ml vandens.

2. Naudojimas su geriamuoju vandeniu

Vakcinos dozių skaičių, kuris atitinka vakcinuojamų paukščių skaičių, reikia atskiesti vėsiu ir švari vandeniu be chloro, kitų dezinfekantų ar priemaišų likučių.

Vakcina turi būti paruošta prieš pat naudojimą.

Vakcinai skiesti skirtą vandens kiekį priklauso nuo paukščių amžiaus, veislės, ūkininkavimo praktikos ir oro sąlygų.

Norint nustatyti vandens kiekį, kurio reikia atskiesti vakcinai, skirtai jaunesnio amžiaus viščiukų (iki trečios gyvenimo savaitės) vakcinacijai, taikomos šios rekomendacijos:

- paukščių skaičių tūkstančiais reikia padauginti iš jų gyvenimo dienos (pvz., 1 tūkstantis viščiukų 7-ąją gyvenimo dieną = $1 \times 7 = 7$ l).

Svarbu vakciną atskiesti tokia vandens kiekyje, kuris būtų išgertas per 1,5–2,5 val. (atsižvelgiant į skirtingus paukščių girdymo sistemų tipus).

Kad paukščiai ištrokštų, geriamojo vandens tiekimą reikia nutraukti likus ne daugiau kaip 2 val. iki vakcinacijos (priklausomai nuo oro temperatūros).

Visada reikia įsitikinti, kad vakcinacijos metu būtų lesalo. Paukščiai negers, jei neturės lesalo.

Girdymo sistema turi būti švari, be chloro, kitų dezinfekantų ar priemaišų likučių.

3. Naudojimas lašinant į akis ar šnerves

1 000 dozių vakcinos reikia atskiesti 100 ml distiliuoto vandens.

Paruoštos vakcinos dozė yra 0,1 ml, t. y. du lašai iš standartizuoto lašintuvo (kurio lašelio dydis yra žinomas ir pastovus), nepriklausomai nuo paukščių amžiaus, svorio ir rūšies. Vieną lašą (0,05 ml) reikia įlašinti į akį ir vieną lašą (0,05 ml) – į šnervę. Prieš paleidžiant paukštį, reikia įsitikinti, kad lašas į šnervę buvo įkvėptas.

3.10. Perdozavimo simptomai (pirmosios pagalbos priemonės ir priešnuodžiai, jei būtina)

Panaudojus 10 kartų didesnę nei rekomenduojama dozę, nenustatyta jokių nepageidaujamų reakcijų, išskyrus aprašytąsias p. „Nepageidaujami reiškiniai“.

3.11. Specialieji naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos, įskaitant antimikrobinių ir antiparazitinių veterinarinių vaistų naudojimo apribojimus, kuriais siekiama apriboti atsparumo išsivystymo riziką

Netaikytinos.

3.12. Išlauka

0 parų.

4. IMUNOLOGINĖS SAVYBĖS

4.1. ATCvet kodas: QI01AD07

Vakcina skirta viščiukams skatinti aktyvų imunitetą paukščių infekcinio bronchito viruso į QX panašioms padermėms (vakcininė padermė QX 1285 priklauso D388 serotipui / GI-19 linijai).

5. FARMACINIAI DUOMENYS

5.1. Pagrindiniai nesuderinamumai

Negalima maišyti su jokių kitų veterinariniu vaistu, išskyrus nurodytus 3.8 p.

5.2. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 18 mėn.
Tinkamumo laikas, paruošus pagal nurodymus, – 3 val.

5.3. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C).
Negalima sušaldyti.
Saugoti nuo šviesos.

5.4. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Vakcina tiekama bespalvio stiklo (I tipo) flakonuose, užkimštuose brombutilinės gumos kamščiais ir užsandarintuose aliumininiais dangteliais.

Pakuočių dydžiai

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 10 flakonų po 1 000 dozių vakcinos.

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 10 flakonų po 2 500 dozių vakcinos.

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 10 flakonų po 5 000 dozių vakcinos.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

5.5. Specialiosios nesunaudotų veterinarinių vaistų ar su jų naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas.

6. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

IZO S.r.l. a socio unico

7. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/25/2889/001-003

8. REGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 2025-07-25

9. PASKUTINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠO PERŽIŪROS DATA

2025-12-16

10. VETERINARINIŲ VAISTŲ KLASIFIKACIJA

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PRIEDAS
ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

{Kartoninė dėžutė su 10 flakonų}

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Avishield IB QX, liofilizatas akių ir nosies suspensijai ar naudoti su geriamuoju vandeniu

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Kiekvienoje dozėje yra:

gyvo QX tipo 1285 padermės paukščių infekcinio bronchito viruso $10^{3,7}-10^{5,3}$ EID₅₀.

3. PAKUOTĖS DYDIS

10 x 1 000 dozių

10 x 2500 dozių

10 x 5000 dozių

4. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Vištos (broileriai, būsimos dedeklės ir veislinės vištos).

5. INDIKACIJA (-OS)**6. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)**

Naudoti į akis ar šnerves, purškiant arba su geriamuoju vandeniu.

7. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

8. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

Paruošus sunaudoti per 3 val.

9. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Laikyti ir gabenti šaltai.

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

10. NUORODA „PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYTI PAKUOTĖS LAPELĮ“
--

Prieš naudojimą perskaityti pakuotės lapelį.

11. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“
--

Tik veterinariniam naudojimui.

12. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“
--

Saugoti nuo vaikų.

13. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

IZO S.r.l. a socio unico

14. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/25/2889/001

LT/2/25/2889/002

LT/2/25/2889/003

15. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ**{Stikliniai flakonai, kuriuose yra 1 000, 2 500 arba 5 000 dozių vakcinos}****1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Avishield IB QX

2. VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ KIEKYBINĖ INFORMACIJA

Kiekvienoje dozėje yra:

gyvo QX tipo 1285 padermės paukščių infekcinio bronchito viruso $10^{3,7}-10^{5,3}$ EID₅₀

1 000 dozių.

2 500 dozių.

5 000 dozių.

3. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

4. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

Paruošus sunaudoti per 3 val.

B. PAKUOTĖS LAPELIS

PAKUOTĖS LAPELIS

1. Veterinarinio vaisto pavadinimas

Avishield IB QX, liofilizatas akių ir nosies suspensijai ar naudoti su geriamuoju vandeniu vištoms

2. Sudėtis

Kiekvienoje dozėje yra:

veikliosios medžiagos:

gyvo QX tipo 1285 padermės paukščių infekcinio bronchito viruso $10^{3,7} - 10^{5,3}$ EID₅₀*.

* EID₅₀=50 % embrionų užkrečianti dozė (viruso titras, kuris 50 % užkrėstų embrionų sukelia infekciją)

Nuo kreminės iki geltonos spalvos liofilizatas.

3. Paskirties gyvūnų rūšys

Vištos.

4. Naudojimo indikacijos

Vištoms (broileriams, būsimoms dedeklėms ir veislinėms vištaitėms) aktyviai imunizuoti, siekiant sumažinti kvėpavimo sutrikimo požymius dėl paukščių infekcinio bronchito, kurį sukelia į QX panašūs infekcinio bronchito viruso (IBV) variantai.

Imuniteto pradžia: 3 sav. po vakcinacijos.

Imuniteto trukmė: 10 sav. po vakcinacijos.

5. Kontraindikacijos

Nėra.

6. Specialieji įspėjimai

Specialieji įspėjimai

Vakcinuoti tik sveikus gyvūnus.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims

Visi vieno būrio paukščiai turi būti vakcinuojami vienu metu.

Vakcinuoti viščiukai gali išskirti vakcininės padermės mikroorganizmus ne mažiau kaip 28 d. po vakcinacijos. Tuo metu reikėtų vengti silpno imuniteto ar nevakcinuotų viščių sąlyčio su vakcinuotais.

Norint išvengti vakcininės padermės mikroorganizmų išplitimo tarp imlių rūšių gyvūnų, reikėtų taikyti atitinkamas veterinarines ir gyvūnų laikymo priemones.

Avishield IB QX vakcina skirta apsaugoti viščiukus tik nuo kvėpavimo takų ligos požymių, kuriuos sukelia IBV ir QX panaši padermės, ir neturėtų būti naudojama kaip kitų IBV vakcinų pakaitalas. Reikia užtikrinti, kad QX padermė nepatektų į teritoriją, kurioje jos nėra.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Šią vakciną ruošti ir naudoti reikia atsargiai. Panaudojus vakciną, reikia nusiplauti ir dezinfekuoti rankas bei įrangą, kad būtų išvengta viruso plitimo. Purškiant vakciną, operatorius ir darbuotojai turi dėvėti asmenines apsaugos priemones, kurias sudaro kaukė su akių apsauga.

Dedantys kiaušinius paukščiai

Negalima naudoti paukščiams kiaušinių dėjimo metu ir 4 sav. iki kiaušinių dėjimo pradžios.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad šią vakciną galima maišyti ir naudoti purškiant kartu su vakcinomis Avishield IB H120 ir Avishield IB GI-13. Prieš naudojimą reikia perskaityti šių dviejų vakcinų pakuotės lapelius.

Sumaišytų vakcinų saugumo rodikliai nesiskiria nuo tų, kurie nustatyti atskirai naudojamoms vakcinoms.

Imuniteto pradžia panaudojus sumaišytas vakcinas, yra 3 savaitės, o imuniteto trukmė – 8 savaitės Avishield IB H120 ir Avishield IB GI-13, ir 10 savačių Avishield IB QX.

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą naudojant su kitu veterinariniu vaistu, išskyrus aukščiau paminėtus vaistus. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

Perdozavimas

Panaudojus 10 kartų didesnę nei rekomenduojama dozę, nenustatyta jokių nepageidaujamų reakcijų, išskyrus aprašytąsias p. „Nepageidaujami reiškiniai“.

Pagrindiniai nesuderinamumai

Negalima maišyti su jokių kitu veterinariniu vaistu, išskyrus tuos, kurie paminėti aukščiau p. „Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos“.

7. Nepageidaujami reiškiniai

Vištos

Dažnas (1–10 gyvūnų iš 100 gydytų gyvūnų)	Čiaudėjimas.*
--	---------------

* Pirmąją savaitę po vakcinacijos. Jei pasireiškia, ji praeina savaime ir gydyti nereikia.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamus reiškinius. Tai leidžia nuolat stebėti vaisto saugumą. Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, pirmiausia būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Apie bet kokius nepageidaujamus reiškinius taip pat galite pranešti registruotojui arba jo vietiniam atstovui naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba perduodami informaciją per savo nacionalinę pranešimų sistemą:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

El. paštas: vaistu.registracija@vmvt.lt

Pranešimo forma:

<https://vmvt.lrv.lt/lt/fb/>

8. Dozės, naudojimo būdai ir metodas kiekvienai rūšiai

Naudoti purškiant stambiais lašais ar lašinant į akis ar šnerves – nuo 1 d. amžiaus.

Naudoti su geriamuoju vandeniu – nuo 7 d. amžiaus.

Vakcina turi būti skiriama po vieną dozę kiekvienam paukščiui purškiant stambiais lašais, lašinant į akis ar šnerves arba su geriamuoju vandeniu. Jei viščiukų skaičius yra tarp standartinių dozių, reikia naudoti artimiausią didesnę dozę.

9. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo

Praskiedus, vakcina atrodo kaip skaidri ar šiek tiek opalescuojanti suspensija.

1. Naudojimas purškiant stambiais lašais

Rekomenduojama 1 000 dozių vakcinos skiesti 150–300 ml distiliuoto vandens. Naudotinių dozių skaičius atitinka paukščių skaičių pulke.

Skiedimui naudojamo vandens kiekis turi būti pakankamas, kad būtų užtikrintas tolygus paskleidimas purškiant ant paukščių, ir priklauso nuo vakcinuojamų paukščių amžiaus ir laikymo sistemos, tačiau 1 000 dozių siūloma naudoti ne mažiau kaip 150–300 ml vandens.

Paruošta vakcinos suspensija turi būti tolygiai purškiama ant atitinkamo skaičiaus viščiukų 30–40 cm atstumu stambiais lašais (tikslinis vidutinis lašelio dydis – 150–170 mikrometrų), geriausia tuomet, kai viščiukai tupi kartu esant silpnam apšvietimui. Purškimo aparatas turi būti be nuosėdų, korozijos ir dezinfekantų likučių ir geriausia, kad jis būtų naudojamas tik vakcinacijai. Vakcinacijos metu ir po jos ventiliacija turėtų būti išjungta, kad būtų išvengta oro turbulencijos.

Maišant šią vakciną su Avishield IB H120 ir Avishield IB GI-13, reikia naudoti tokį patį bendrą vandens kiekį kaip ir naudojant ją vieną. Pavyzdžiui, 1 000 dozių Avishield IB QX, 1 000 dozių Avishield IB H120 ir 1 000 dozių Avishield IB GI-13 turi būti atskiestos bendrai 150–300 ml vandens.

2. Naudojimas su geriamuoju vandeniu

Vakcinos dozių skaičių, kuris atitinka vakcinuojamų paukščių skaičių, reikia atskiesti vėsiu ir švari vandeniu be chloro, kitų dezinfekantų ar priemaišų likučių.

Vakcina turi būti paruošta prieš pat naudojimą.

Vakcinai skiesti skirtu vandens kiekis priklauso nuo paukščių amžiaus, veislės, ūkininkavimo praktikos ir oro sąlygų.

Norint nustatyti vandens kiekį, kurio reikia atskiesti vakcinai, skirtai jaunesnio amžiaus viščiukų (iki trečios gyvenimo savaitės) vakcinacijai, taikomos šios rekomendacijos:

- paukščių skaičių tūkstančiais reikia padauginti iš jų gyvenimo dienos (pvz., 1 tūkstantis viščiukų 7-ąją gyvenimo dieną = $1 \times 7 = 7$ l).

Svarbu vakciną atskiesti tokiam vandens kiekyje, kuris būtų išgertas per 1,5–2,5 val. (atsižvelgiant į skirtingus naminių paukščių girdymo sistemų tipus).

Kad paukščiai ištrokštų, geriamojo vandens tiekimą reikia nutraukti likus ne daugiau kaip 2 val. iki vakcinacijos (priklausomai nuo oro temperatūros).

Visada reikia įsitikinti, kad vakcinacijos metu būtų lesalo. Paukščiai negers, jei neturės lesalo. Gėrimo sistema turi būti švari, be chloro, kitų dezinfekantų ar priemaišų likučių.

3. Naudojimas lašinant į akis ar šnerves

1 000 dozių vakcinos reikia atskiesti 100 ml distiliuoto vandens.

Paruoštos vakcinos dozė yra 0,1 ml, t. y. du lašai iš standartizuoto lašintuvo (kurio lašelio dydis yra žinomas ir pastovus), nepriklausomai nuo paukščių amžiaus, svorio ir rūšies. Vieną lašą (0,05 ml) reikia įlašinti į akį ir vieną lašą (0,05 ml) – į šnervę. Prieš paleidžiant paukštį, reikia įsitikinti, kad lašas į šnervę buvo įkvėptas.

10. Išlauka

0 parų.

11. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C).

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės ir dėžutės po {Exp.}. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Tinkamumo laikas, paruošus pagal nurodymus, – 3 val.

12. Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas. Šios priemonės turi padėti apsaugoti aplinką.

Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais.

13. Veterinarinių vaistų klasifikacija

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. Registracijos numeriai ir pakuočių dydžiai

LT/2/25/2889/001-003

Pakuočių dydžiai

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 10 flakonų po 1 000 dozių vakcinos.

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 10 flakonų po 2 500 dozių vakcinos.

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 10 flakonų po 5 000 dozių vakcinos.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

15. Pakuotės lapelio paskutinės peržiūros data

2025-12-16

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktiniai duomenys

Registruotojas:

IZO S.r.l. a socio unico, Via San Zeno 99/A, 25124 Brescia, Italija

Email: info@vaxxinova.it

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

Genera d.d.

Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Kroatija

Kontaktiniai duomenys, skirti pranešti apie įtariamus nepageidaujamus reiškinius:

IZO S.r.l. a socio unico, Via San Zeno 99/A, 25124 Brescia, Italija

Tel. +39 030 2420583

Email: farmacovigilanza@izo.it

17. Kita informacija

Vakcina skirta viščiukams skatinti aktyvų imunitetą paukščių infekcinio bronchito viruso į QX panašioms padermėms (vakcininė padermė QX 1285 priklauso D388 serotipui / GI-19 linijai).

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.