

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**PLASTENKA 250 ml, 1000 ml****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Sebacil 500 mg/ml koncentrat za emulzijo za kopel

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Foksim 500 mg/ml

3. VELIKOST PAKIRANJA250 ml
1000 ml**4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Prašiči, ovce in psi.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Dermalna uporaba.

7. KARENCA

Karenca:

Prašiči: meso in organi: 9 dni.

Ovce: meso in organi: 42 dni.

mleko: ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odprto zdravilo uporabite v 6 mesecih.

Pripravljeno emulzijo uporabite v dveh dnevih.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Elanco 

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0310/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}