

## Gebrauchsinformation

### **Vetokehl Bov D5**

#### **Flüssige Verdünnung zur Injektion**

Für Tiere

Pferd, Rind, Hund, Katze, Hühner, kleine Nagetiere, Ziervögel,  
Puten, Tauben, Enten, Gänse, Wachteln

Homöopathisches Arzneimittel

Wirkstoff:

Mycobacterium bovis (BCG) e volumine cellulæ (lyophil., steril.) D5 Dil. aquos.

#### **Anwendungsgebiete:**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

#### **Gegenanzeigen:**

Keine bekannt.

#### **Wechselwirkungen:**

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn **Vetokehl Bov D5** gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

#### **Zieltierarten:**

Pferd, Rind, Hund, Katze, Hühner, kleine Nagetiere, Ziervögel, Puten, Tauben, Enten, Gänse, Wachteln

#### **Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet:

bei Pferden und Rindern:

2 x wöchentlich 1 - 2 ml

bei Fohlen, Kälbern:

2 x wöchentlich 1

ml

bei Hunden, Katzen, Hühnern, Puten, Gänsen, Enten,

Tauben, Wachteln:

1 x wöchentlich 1 ml

bei Ziervögeln und kleinen Nagetieren:

1 x wöchentlich 0,5 ml

subkutan injizieren.

Die Dosierung soll dem Befund angepasst werden.

Die Anwendung des Präparates sollte beendet werden, wenn die für das Arzneimittelbild relevanten Symptome nicht mehr auftreten.

#### **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die richtige Anwendung:**

Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Eine Injektion dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen. Unsachgemäß durchgeführte Injektionen können zu bleibenden Schäden bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Nach Applikation ist das Tier über einen angemessenen Zeitraum zu beobachten, um bei Anzeichen einer anaphylaktischen Reaktion sofort therapeutische Maßnahmen ergreifen zu können.

**Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation oder der Legeperiode:**

Zur Verträglichkeit von **Vetokehl Bov D5** bei trächtigen und laktierenden Tieren sowie bei Tieren in der Legeperiode liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation bzw. während der Legeperiode nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

**Nebenwirkungen:**

Keine bekannt.

**Hinweis:**

Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

**Wartezeit:**

Pferd, Rind, Kalb, Hühner, Puten, Gänse, Enten, Tauben, Wachteln:

Essbares Gewebe: 0 Tage

Milch: 0 Tage

Eier: 0 Tage

**Besondere Lagerungshinweise:**

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Bitte lagern Sie das Arzneimittel nicht über 25 °C!

Das Verfalldatum ist auf der Ampulle und der äußeren Umhüllung aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

**Zusammensetzung:**

1 Ampulle zu 1 ml enthält:

Wirkstoff:

1 ml Mycobacterium bovis (BCG) e volumine cellulæ (lyophil., steril.) D5 Dil. aquos.  
(HAB, Vorschriften 5b, 11)

**Inhalt:**

10 / 50 Ampullen zu 1 ml flüssige Verdünnung zur s.c. Injektion

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG

Hasseler Steinweg 9

27318 Hoya

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr. 31924.00.00

Datum der Gebrauchsinformation:

---

**Hinweis:**

Zur weiteren Anwendung steht Ihnen **Vetokehl Bov** Flüssige Verdünnung zur Verfügung.