

A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**EMBALLAGE DE GROUPEMENT:**

Spray aérosol de 200 ml, dans un emballage individuel ou par groupe de 6 ou de 12.

La notice est imprimée dans les 3 langues nationales sur l'emballage. Le texte ci-dessous reprend les informations requises légalement pour l'étiquette mais le texte de la notice peut s'y substituer.

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**POVIDERM SPRAY****2. LISTE DU (DES) PRINCIPE(S) ACTIF(S) ET D'AUTRES SUBSTANCES**

Formula: 3,0 g Povidonum Iodinatum, eq. 300 mg Iodum, Glycerolum, Povidonum, Ethanolum q.s. ad 100 g – Propanum / Butanum 43,92 g

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Spray pour application sur la peau et les plaies

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1, 6, 12 X 200 ml

5. ESPÈCES CIBLES

Chien, lapin

6. INDICATION(S)

Traitement d'appoint préventif des infections cutanées et des plaies.

7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Éliminer les poils et les souillures si nécessaire. Tenir le flacon verticalement et vaporiser pendant quelques secondes à une distance de 10 à 30 cm, jusqu'à ce que les surfaces à traiter soient couvertes d'un fin film homogène.

Le traitement sera éventuellement répété plusieurs fois par jour, jusqu'à l'obtention d'une amélioration visible au niveau des zones à traiter.

8. TEMPS D'ATTENTE

Non applicable.

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

La mention "Lire la notice avant emploi" n'est pas considérée nécessaire si la notice est imprimée sur l'emballage.

Contient du propane / butane. Conditionnement sous pression. Ne pas exposer aux rayons du soleil ni à des températures excédant les 50°C. Tenir éloigné des flammes. Ne pas fumer.

Assurer une ventilation suffisante afin d'éviter des vapeurs explosives.

Ne pas ouvrir le flacon, ne pas le brûler ni le perforer, même lorsqu'il est vide. Vider le flacon de son contenu avant de le jeter.

10. DATE DE PÉREMPTION

EXP: ... {MM/AAAA}

Après ouverture, utiliser avant ...

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Ne pas conserver à une température de plus de 25°C, ni au frais, ni congelé.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tout produit non utilisé ou dérivé de ce médicament doit être éliminé conformément aux exigences locales en vigueur. Les mesures de précautions adéquates doivent être prises pour que le produit ne se retrouve pas dans les cours d'eau vu les risques éventuels pour les organismes aquatiques.

13. LA MENTION “À USAGE VÉTÉRAINAIRE” ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT

À usage vétérinaire.

Délivrance libre.

14. LA MENTION “TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Emdoka bvba, John Lijsenstraat 16, B-2321 Hoogstraten

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V197005

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

LOT:

Uitwendig gebruik

Usage externe

Äusserliche Anwendung



Légèrement inflammable.

Distributeur: Ecuphar NV, Legeweg 157I, B-8020 Oostkamp

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

Flacons aérosols de 200 ml de solution antiseptique

La notice est imprimée dans les 3 langues nationales sur le flacon aérosol. Le texte ci-dessous reprend les informations requises légalement pour l'étiquette mais le texte de la notice peut s'y substituer.

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

POVIDERM SPRAY

2. LISTE DU (DES) PRINCIPE(S) ACTIF(S) ET D'AUTRES SUBSTANCES

Formula: 3,0 g Povidonum Iodinatum, eq. 300 mg Iodum, Glycerolum, Povidonum, Ethanolum q.s. ad 100 g – Propanum / Butanum 43,92 g

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Spray pour application sur la peau et les plaies

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

200 ml

5. ESPÈCES CIBLES

Chien, lapin

6. INDICATION(S)

Traitement d'appoint préventif des infections cutanées et des plaies.

7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Éliminer les poils et les souillures si nécessaire. Tenir le flacon verticalement et vaporiser pendant quelques secondes à une distance de 10 à 30 cm, jusqu'à ce que les surfaces à traiter soient couvertes d'un fin film homogène.

Le traitement sera éventuellement répété plusieurs fois par jour, jusqu'à l'obtention d'une amélioration visible au niveau des zones à traiter.

8. TEMPS D'ATTENTE

Non applicable.

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

La mention "Lire la notice avant emploi" n'est pas considérée nécessaire si la notice est imprimée sur le flacon aérosol.

Contient du propane / butane. Conditionnement sous pression. Ne pas exposer aux rayons du soleil ni à des températures excédant les 50°C. Tenir éloigné des flammes. Ne pas fumer.

Assurer une ventilation suffisante afin d'éviter des vapeurs explosives.

Ne pas ouvrir le flacon, ne pas le brûler ni le perforer, même lorsqu'il est vide. Vider le flacon de son contenu avant de le jeter.

10. DATE DE PÉREMPTION

EXP: ... {MM/JJJ}

Après ouverture, utiliser avant ...

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Ne pas conserver à une température de plus de 25°C, ni au frais, ni congelé.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tout produit non utilisé ou dérivé de ce médicament doit être éliminé conformément aux exigences locales en vigueur.

Les mesures de précautions adéquates doivent être prises pour que le produit ne se retrouve pas dans les cours d'eau vu les risques éventuels pour les organismes aquatiques.

13. LA MENTION “À USAGE VÉTÉRINAIRE” ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT

À usage vétérinaire.

Délivrance libre.

14. LA MENTION “TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Emdoka bvba, John Lijssenstraat 16, B-2321 Hoogstraten

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V197005

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

LOT:

Uitwendig gebruik

Usage externe

Äusserliche Anwendung



Légèrement inflammable.

Distributeur: Ecuphar NV, Legeweg 157I, B-8020 Oostkamp