

B. PACKUNGSBEILAGE

PACKUNGSBEILAGE

KILTIX® für kleine Hunde.
KILTIX® für mittelgroße Hunde.
KILTIX® für große Hunde.

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber:

Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen
Deutschland

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Deutschland

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

KILTIX® für kleine Hunde.
KILTIX® für mittelgroße Hunde.
KILTIX® für große Hunde.

3. ARZNEILICH WIRKSAME(R) BESTANDTEIL(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

10 g Halsband enthält 1,00 g Propoxur und 0,225 g Flumethrin.

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Bekämpfung von Zecken (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) und Flöhen (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*) bei Hunden sowie zum Schutz vor Neubefall. Wenn das Halsband dauerhaft getragen wird, bleibt es während maximal 6 Monaten wirksam gegen Zecken und Flöhe.

5. GEGENANZEIGEN

Das Halsband darf nicht bei Hunden mit ausgedehnten Hautläsionen angelegt werden.
Das Halsband darf nicht bei kranken oder genesenden Hunden angelegt werden.
Nicht bei Katzen anwenden.

6. NEBENWIRKUNGEN

Gelegentlich kann während der ersten Tage nach Anlegen des Halsbandes ein leichter Juckreiz wahrgenommen werden.

Falls Sie Nebenwirkungen oder sonstige Reaktionen feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt mit.

7. ZIELTIERART

Hunde.

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Ein Halsband KILTIX® (12,5 g und 35 cm Länge) für einen kleinen Hund.

Ein Halsband KILTIX® (30,2 g und 48 cm Länge) für einen mittelgroßen Hund.

Ein Halsband KILTIX® (45,0 g und 66 cm Länge) für einen großen Hund.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Nehmen Sie das Halsband aus der Schutzverpackung, entrollen Sie es und entfernen Sie die Plastik Bolzen an der Innenseite des Halsbandes. Legen Sie das Halsband locker um den Hals des Hundes an, und schieben Sie den überhängenden Teil durch die Laschen.

Während der ersten Tage nach Anbringen des Halsbandes muß der Eigentümer die um das Halsband herumliegende Haut kontrollieren, um sicherzugehen, daß das Halsband nicht zu straff sitzt (es wird ein zwei Finger breiter Raum zwischen Halsband und Hals empfohlen).

Das Halsband muß ununterbrochen getragen werden. Das Halsband ist wirksam, ob das Tier sich bewegt oder ruht. Die Wirkung gegen Flöhe und Zecken beginnt innerhalb von 24 Stunden nach Anlegen des Halsbandes und hält bis zu 6 Monate lang an. Dauer und Grad des Schutzes hängen von Länge und Zustand des Fells, von der Aktivität des Tieres und dem Befallsdruck ab. Das Halsband früher ersetzen wenn die Wirksamkeit abnehmt.

In Einzelfällen ist während des Tragens des Halsbandes ein Befall mit Zecken möglich.

Diese Zecken können sich anklammern aber sterben zuletzt nach 3 Tage ohne Blut gesaugen zu haben.

Das Halsband abnehmen wenn der Hund schwimmen geht oder beim Baden und aufs neue anbringen wenn der Fell wieder trocken ist. Durch häufiges Naßwerden (Regen, Schwimmen, Baden) kann die Wirksamkeit des Halsbandes beeinträchtigt sein.

10. WARTEZEIT

Entfällt.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Aufbewahren in einer guten geschlossenen Verpackung

Außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

Nicht anwenden nach dem angegebenen Verfalldatum auf der Verpackung nach den Buchstaben "EXP".

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren

Neben die auf dem Hund befindlichen Flöhen können sich ebenfalls Eier, Larven und Puppen in der Umgebung befinden. Diese können sich bis neue erwachsene Flöhen auswachsen. Für eine effektive Flöhenbekämpfung sollen auch diese Stadia in der Lebensumgebung der Hunde bestritten werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

Personen mit Überempfindlichkeit gegenüber einen der Inhaltsstoffe sollten den Kontakt mit dem Halsband vermeiden

Vermeiden Sie einen übermäßigen Kontakt mit dem Halsband während des Anlegens. Nach dem Anlegen die Hände gründlich waschen.

Vermeiden Sie, daß Kinder mit dem Halsband spielen.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation

Aus den Ergebnissen von Labortests die an verschiedenen Tierarten ausgeführt wurden, geht hervor, daß keine ungewünschten Wirkungen zu erwarten sind.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen

Als allgemeine Vorsichtsmaßnahme, gleichfalls für andere Antiparasitika gültig, sollten besser keine anderen Insektizide beim Hund gebraucht werden, auch während des Tragens des Halsbandes.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel)

Wenn das Tierarzneimittel versehentlich aufgenommen wird, können Unverträglichkeitssymptome oder Vergiftungssymptome auftreten, sowie Hypersalivation, Korestenoma, Erbrechen, Durchfall, abnehmende Beweglichkeit oder Atembeschwerden. In solchen Fälle ist unmittelbar ein Arzt zu Rate zu ziehen.

Gegenmittel: Atropinsulphat gegen Propoxur. Für Flumethrin ist kein spezifisches Gegenmittel bekannt (symptomatische Behandlung).

13. BESONDERE VORSICHTSMASSENNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Das Mittel darf nicht in Gewässer gelangen, da es eine Gefahr für Fische und andere Wasserorganismen darstellen kann.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

November 2020

Nicht verschreibungspflichtig.

BE-V189253

BE-V189262

BE-V184572