

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**ŠKATLA****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

CEFSHOT DC 250 mg intramamarna suspenzija za govedo

cefalonium (kot cefalonium dihidrat)

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

Vsak 3g intramamarni injektor vsebuje:

Učinkovina:

cefalonium 250 mg (kot cefalonium dihidrat)

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Intramamarna suspenzija

4. VELIKOST PAKIRANJA

24 ali 120 intramamarnih injektorjev in čistilnih krpic

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (krave v presušitvi)

6. INDIKACIJA(E)

Za zdravljenje subkliničnih mastitisov v presušitvi in za preprečevanje novih bakterijskih okužb vimena v času, ko krave niso v laktaciji, in ki jih povzročajo *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Trueperella pyogenes*, *Escherichia coli* in *Klebsiella* spp.

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:

Meso in organi:

21 dni

Mleko:

- 96 ur po telitvi, če je bilo obdobje presušitve daljše od 54 dni
- 58 dni po dajanju zdravila, če je bilo obdobje presušitve krajše ali enako 54 dnom.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne zamrzujte.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne stvari odstranite v skladu z lokalnimi zahtevami.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA,
Rue Laid Burniat 1,
1348 Louvain-la-Neuve,
Belgija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

DC/V/0538/001

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

POLIETILENSKI INJEKTOR

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

CEFSHOT DC 250 mg intramamarna suspenzija za govedo

cefalonium (kot cefalonium dihidrat)

2. KOLIČINA UČINKOVIN(E)

cefalonium 250 mg (kot cefalonium dihidrat)

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

3 g

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Intramamarno dajanje.

5. KARENCA

Karenca:

Meso in organi:

21 dni

Mleko:

- 96 ur po telitvi, če je bilo obdobje presušitve daljše od 54 dni
- 58 dni po dajanju zdravila, če je bilo obdobje presušitve krajše ali enako 54 dnem.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

6. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.