

NAVODILO ZA UPORABO
Albiotic intramamarna raztopina za krave v laktaciji

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER PROIZVAJALEC ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

Huvepharma NV, Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerp, Belgija

Proizvajalec odgovoren za sproščanje serije:

Biovet Joint Stock Company, 39, Petar Rakov Str., 4550 Peshtera, Bolgarija

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Albiotic intramamarna raztopina za krave v laktaciji

3. NAVEDBA UČINKOVIN(E) IN DRUGE(IH) SESTAVIN

10 ml sterilne intramamarne raztopine (en injektor) vsebuje:

Učinkovine:

linkomicin (v obliki linkomicinijevega klorida)	330 mg
neomicin (v obliki neomicinijevega sulfata)	100 mg

Pomožne snovi:

dinatrijev edetat	5 mg
-------------------	------

4. INDIKACIJA(E)

Zdravljenje mastitisa pri kravah v obdobju laktacije.

Zdravilo učinkuje proti *Staphylococcus* spp. (vrstam, ki proizvajajo penicilinaze ter vrstam, ki je ne proizvajajo), vključno s *Staphylococcus aureus*, proti *Streptococcus* spp., vključno s *Streptococcus agalactiae*, *S. dysgalactiae* in *S. uberis* in proti koliformnim bakterijam, vključno z *E. coli*.

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabite v primerih preobčutljivosti na učinkovine ali na katero koli pomožno snov.

6. NEŽELENI UČINKI

Jih ni.

Če opazite kakršne koli stranske učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo ali mislite, da zdravilo ni delovalo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (krave v laktaciji).

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Zdravilo dajajte intramamarno.

Vsebina enega injektorja (10 ml) zadostuje za zdravljenje ene vimenske četrti. Zdravilo aplicirajte še dvakrat v razmaku 12 ur.

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Pri dajanju zdravila pazite, da ne poškodujete seskovega kanala. Pred dajanjem zdravila, seske in vime umijte s toplo vodo, ki vsebuje blago razkužilo in jih posušite. Obolelo vimensko četrt pred aplikacijo povsem izmolzite. Vrh seska razkužite z razkužilnim robčkom ali drugim primernim sredstvom. Za vsak sesek uporabite nov robček.

10. KARENCA

Mleko: 84 ur.

Meso in organi: 3 dni.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

Ne shranjujte pri temperaturi nad 30 °C. Zaščitite pred zamrznitvijo.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini po EXP. Rok uporabnosti zdravila se nanaša na zadnji dan v navedenem mesecu.

12. POSEBNA OPOZORILA

Zdravila Albiotic ne dajajte kravam v času presušitve.

Zdravila ne dajajte skupaj z makrolidnimi antibiotiki (npr. eritromicinom ali spiramicinom), saj se linkomicin in makrolidi vežejo na isto 50S podenoto bakterijskega ribosoma in delujejo antagonistično.

Osebe z znano preobčutljivostjo na linkozamide naj bodo pri rokovanju z zdravilom Albiotic posebej previdne in morajo nositi zaščitne rokavice.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Ti ukrepi pomagajo varovati okolje.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITEV NAVODIL ZA UPORABO

26.8.2019

15. DRUGE INFORMACIJE

Številka dovoljenja za promet: NP/V/0188/001

Način izdaje zdravila: Na veterinarski recept. Rp-Vet.

Pakiranje: Škatla z 20, 24 ali 96 polietilenskimi injektorji s po 10 ml. Ni nujno, da so v prometu vsa

navedena pakiranja.

Rok uporabnosti: Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za prodajo: 3 leta.