

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**PUDEŁKO TEKTUROWE ZAWIERAJĄCE 1 x 5 DAWEK/ 1 x 25 DAWEK/ 1 x 50 DAWEK/
1 x 125 DAWEK/ 5 x 10 DAWEK****PUDEŁKO PLASTIKOWE ZAWIERAJĄCE 10 x 5 DAWEK****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Erysin Single Shot, emulsja do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda dawka szczepionki (2 ml) zawiera:

Substancje czynne:

Inaktywowany szczep 2-64 <i>E. rhusiopathiae</i> , serotyp 2a	≥ 1 RP *
Inaktywowany szczep 2-5 <i>E. rhusiopathiae</i> , serotyp 2a	≥ 1 RP *
Inaktywowany szczep 2-II <i>E. rhusiopathiae</i> , serotyp 2a	≥ 1 RP *
Inaktywowany szczep 1-203 <i>E. rhusiopathiae</i> , serotyp 1a	≥ 1 RP *

*) przeczytać ulotkę

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 x 10 ml (1 x 5 dawek)
5 x 20 ml (5 x 10 dawek)
1 x 50 ml (1 x 25 dawek)
1 x 100 ml (1 x 50 dawek)
1 x 250 ml (1 x 125 dawek)

10 x 10 ml (10 x 5 dawek)

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnia.

**5. WSKAZANIA LECZNICZE****6. DROGI PODANIA**

Podanie podskórne.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji: Zero dni.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 10 dni.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce (2°C -8°C).
Nie zamrażać.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”
--

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Grabikowski-Grabikowska
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „INEX” Spółka Jawna

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

2110/11

15. NUMER SERII

Lot

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

FIOLKA SZKLANA TYPU II / FIOŁKA PLASTIKOWA (50 dawek)
FIOLKA PLASTIKOWA (125 dawek)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Erysin Single Shot, emulsja do wstrzykiwań dla świń

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda dawka (2 ml) zawiera:

Substancje czynne:

Inaktywowany szczep 2-64 <i>E. rhusiopathiae</i> , serotyp 2a	≥ 1 RP *
Inaktywowany szczep 2-5 <i>E. rhusiopathiae</i> , serotyp 2a	≥ 1 RP *
Inaktywowany szczep 2-II <i>E. rhusiopathiae</i> , serotyp 2a	≥ 1 RP *
Inaktywowany szczep 1-203 <i>E. rhusiopathiae</i> , serotyp 1a	≥ 1 RP *

* przeczytać ulotkę.

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnia.



4. DROGI PODANIA

Podanie podskórne.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji: Zero dni.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do 10 godzin.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce (2°C -8°C).

Nie zamrażać.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Grabikowski-Grabikowska
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „INEX” Spółka Jawna

9. NUMER SERII

Lot

Dodatkowe informacje:

50 dawek
125 dawek

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

**FIOLKA SZKLANA/PLASTIKOWA – 5 DAWEK (10 ml); 10 DAWEK (20 ml); 25 DAWEK
(50 ml)**

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Erysin Single Shot



2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda dawka szczepionki (2 ml) zawiera:

Substancje czynne:

Inaktywowany szczep 2-64 <i>E. rhusiopathiae</i> , serotyp 2a	≥ 1 RP *
Inaktywowany szczep 2-5 <i>E. rhusiopathiae</i> , serotyp 2a	≥ 1 RP *
Inaktywowany szczep 2-II <i>E. rhusiopathiae</i> , serotyp 2a	≥ 1 RP *
Inaktywowany szczep 1-203 <i>E. rhusiopathiae</i> , serotyp 1a	≥ 1 RP *

*) przeczytać ulotkę

3. NUMER SERII

Lot

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 10 godzin.

Dodatkowe informacje:

5 dawek

10 dawek

25 dawek