

## ETIQUETA-PROSPECTO:

### **APIVAR** **Tira para colmenas**

CN:  
O

## DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

APIVAR  
Tira para colmenas

## COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada tira contiene:

### **Sustancia activa:**

Amitraz ..... 500 mg

Excipientes, c.s.p..... 15 g

## INDICACIONES DE USO

Tratamiento de las parasitosis externas causadas por *Varroa jacobsoni*, sensible a amitraz.

## CONTRAINDICACIONES

Ninguna

## REACCIONES ADVERSAS

No conocidas

## ESPECIES DE DESTINO

Abejas (*Apis mellífera*)

## POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Uso en las colmenas.

Insertar 2 tiras por colmena, colocándolas entre 2 panales.

Tipos de colmena:

- Colmenas tipo Dadant (perfección), colocar una tira entre el tercer y cuarto panel y la otra entre el séptimo y octavo panel, es decir fuera de la cámara de cría.
- Colmenas tipo Layens, colocar una tira entre el quinto y sexto panel y la otra entre el noveno y décimo panel.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-13-04

Retirar las tiras transcurridas 6 semanas.

Normas de uso y calendario de aplicación:

Deberá utilizarse en épocas de poca cría en la colmena. Dependiendo de las zonas climáticas se establecerá el calendario de aplicación:

Zonas cálidas: Agosto- Septiembre.

Zonas semicálidas: Noviembre- Diciembre.

Zonas frías: Enero- Febrero.

## **TIEMPO DE ESPERA**

Miel: 7 días.

No puede recogerse la miel cuando las tiras están presentes en la colmena.

## **PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Conservar a temperatura inferior a 25°C, con el envase herméticamente cerrado.

Período de validez después de abierto el envase: Uso inmediato

## **ADVERTENCIAS ESPECIALES**

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Usar un equipo de protección personal consistente en guantes de goma al manipular el medicamento veterinario.

No comer, beber o fumar durante su utilización.

Lavarse las manos con agua abundante después de manipular el medicamento.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

El efecto toxicológico del amitraz se incrementa en presencia de sales de cobre y la actividad terapéutica disminuye en presencia de butóxido de piperonilo, por lo que el empleo simultáneo de estas dos sustancias con amitraz se debe de evitar.

Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos):

Se ha administrado 5 veces la dosis terapéutica, durante 6 semanas, no habiéndose detectado ningún efecto adverso.

## **PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

**FECHA EN QUE FUE APROBADA LA ETIQUETA-PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ**

Julio 2022

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Formato:** Sobre conteniendo 5 tiras dobles.

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.  
Administración bajo control o supervisión del veterinario.

**FECHA DE CADUCIDAD**

EXP: MM/YYYY

Lote y caducidad: ver en el dorso

Una vez abierto, uso inmediato.

**TAMAÑO DEL ENVASE**

Sobre conteniendo 5 tiras dobles.

**NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

1283 ESP

**NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lot: XXXX

**NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES**Titular de la autorización de comercialización:

Véto-Pharma S.A.S.

12-14 Rue de la Croix Martre

91120 Palaiseau

Francia

[info@vetopharma.com](mailto:info@vetopharma.com)

Fabricante responsable de la liberación del lote:

Véto-Pharma S.A.S

ZA de Champrue

36310 Chaillac

Francia

[info@vetopharma.com](mailto:info@vetopharma.com)