

NOTICE
CLAMOXYL 200 mg, comprimés appétents

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Zoetis Belgium s.a.
rue Laid Burniat, 1
B - 1348 Louvain-la-Neuve

FABRICANT:

Haupt Pharma Latina S.r.l.
Strada Statale 156 Km 47,600
I - 04100 Borgo San Michele (Latina)

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

CLAMOXYL 200 MG, comprimés appétents

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Amoxicillin. trihydrat. (= Amoxicillin. 200 mg) - Magnes. stearas - Silic. dioxid. Colloid. - Methylcellulos. 4000 - Cerevisiae Ferm. sicc. - Cellulos q.s. pro tablet. compres. una

4. INDICATION(S)

En présence d'organismes sensibles, **Clamoxyl comprimés appétents** peut être efficace dans les indications suivantes: infections localisées, infections du tractus alimentaire, infections respiratoires, infections du tractus urogénital, infections bactériennes secondaires et infections généralisées.

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas administrer aux chiens et aux chats qui ont une hypersensibilité connue à la pénicilline ou à d'autres substances du groupe des β-lactames.

Ne pas administrer aux rongeurs (lapins, hamsters, cobayes, gerbilles, ...), ni aux ruminants.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Exceptionnellement, l'administration d'amoxicilline peut provoquer des réactions allergiques, diarrhée et surinfections.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chiens et chats.

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Posologie : 4 à 10 mg/kg, deux fois par jour. En cas d'infections graves ou aiguës, la dose peut être augmentée et/ou répétée à intervalles plus courts sans inconvenient. Ces doses plus élevées sont notamment utilisées chez les jeunes animaux et pour obtenir des concentrations bactéricides lors d'infections à bactéries gram-négatives.

Poids en Kg	Nombre de comprimés à administrer 2 x par jour pour un dosage de 10 mg/kg
< 8	Cf. Clamoxyl 40 mg comprimés appétents
9 – 10	½
11 – 20	1
21 – 30	1.5
31 – 40	2
41 – 50	2.5
> 50	3

Durée du traitement : 5 à 7 jours, dans la plupart des indications thérapeutiques. La durée de traitement peut, à l'appréciation du médecin vétérinaire, être adaptée au cas clinique.

Voie d'administration : Orale.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Pour les animaux très malades, le comprimé pourra éventuellement être broyé et ajouté à la nourriture ou à la boisson. L'administration du **Clamoxyl comprimés appétents** aux espèces cibles est, la plupart du temps, assez aisée, en effet, la présence de levure dans la formulation du médicament lui confère une certaine appétence.

10. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conservé au sec, le **Clamoxyl comprimés appétents** garde toute son activité jusqu'à la date indiquée sur le conditionnement en regard de la mention EXP. (mois-année).

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

- Les pénicillines peuvent causer des réactions d'hypersensibilité après ingestion ou contact cutané.
- L'allergie à la pénicilline peut engendrer une allergie croisée avec les céphalosporines et inversement. Les réactions allergiques causées par ces substances peuvent occasionnellement être graves.
- Les personnes hypersensibles aux pénicillines ou qui ont été informées de ne pas travailler avec de tels produits doivent éviter le contact avec ces préparations.

- Les personnes hypersensibles aux pénicillines porteront des gants lors de l'administration de Clamoxyl comprimés appétents pour éviter le contact avec la peau.
- Ce produit doit être manipulé avec précaution afin d'éviter toute exposition, toutes les précautions recommandées doivent être prises.
- Si vous présentez des réactions d'hypersensibilité après usage de cette préparation (p.ex. érythème), il est recommandé de contacter un médecin et de lui montrer cet avertissement. Des gonflements du visage, des lèvres ou des yeux ou une respiration difficile sont les symptômes les plus graves qui exigent un avis médical immédiat.
- Se laver les mains après usage.
- Femelles gestantes et en lactation : le Clamoxyl comprimés appétents peut être utilisé sans aucun risque en cas de gestation et de lactation.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Les mesures de précaution adéquates doivent être prises pour que le produit ne se retrouve pas dans le milieu environnant.

14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE

Juin 2015.

15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

BE-V127574

Sur prescription vétérinaire.