

## **A. ETIQUETADO**

**DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR**

Caja de cartón

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Finadyne 50 mg/ml solución inyectable

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada ml contiene: 50 mg de flunixin, equivalentes a 83 mg de flunixin meglumina.

**3. TAMAÑO DEL ENVASE**

1 x 50 ml  
6 x 50 ml  
10 x 50 ml  
1 x 100 ml  
10 x 100 ml  
1 x 250 ml  
6 x 250 ml

**4. ESPECIES DE DESTINO**

Bovino, caballos y porcino.

**5. INDICACIONES DE USO****6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Bovino: vía intramuscular o intravenosa.  
Caballos: vía intravenosa.  
Porcino: vía intramuscular.

**7. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempos de espera:

Bovino:

Carne: 4 días (vía intravenosa).  
31 días (vía intramuscular).  
Leche: 24 horas (vía intravenosa).  
36 horas (vía intramuscular).

Porcino:

Carne: 24 días (vía intramuscular).

Caballos:

Carne: 5 días (vía intravenosa)  
Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

**8. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2344 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**

Vial (etiqueta de 100 y 250 ml)

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Finadyne 50 mg/ml solución inyectable

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada ml contiene 50 mg de flunixinolida, equivalentes a 83 mg de flunixinolida meglumina.

**3. ESPECIES DE DESTINO**

Bovino, caballos y porcino.

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Bovino: vía i.m. o i.v.

Caballos: vía i.v.

Porcino: vía i.m.

Lea el prospecto antes de usar.

**5. TIEMPOS DE ESPERA**

Bovino:

Carne: 4 días (vía intravenosa).

31 días (vía intramuscular).

Leche: 24 horas (vía intravenosa).

36 horas (vía intramuscular).

Porcino:

Carne: 24 días (vía intramuscular).

Caballos:

Carne: 5 días (vía intravenosa)

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

**6. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización: \_\_\_\_\_

**7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

**8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

**9. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**

Vial (etiqueta de 50 ml)

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Finadyne

**2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada ml contiene 50 mg de flunixinolona, equivalentes a 83 mg de flunixinolona meglumina.

**3. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**4. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización: \_\_\_\_\_