

Label**M+PAC****- Emulsion zur Injektion für Schweine -****Immunologisch wirksamer Bestandteil und sonstige Bestandteile**

Eine Impfdosis zu 1 ml enthält:

Wirksame Bestandteile:

Mycoplasma hyopneumoniae, inaktiviert $\geq 1,47$ RPE (*)

Adjuvantien:

dünnflüssiges Mineralöl 0,134 ml

Aluminium (als Hydroxid) 1,0 mg

Konservierungsmittel

Thiomersal 0,10 mg

Sonstige Bestandteile ad 1 ml

(*) Relative Einheit; verglichen mit einer definierten Referenz-Vakzine

Packungsgrößen

50 ml (in Abhängigkeit vom Vakzinierungsschema 50 Dosen oder 25 Dosen)

100 ml (in Abhängigkeit vom Vakzinierungsschema 100 Dosen oder 50 Dosen)

200 ml (in Abhängigkeit vom Vakzinierungsschema 200 Dosen oder 100 Dosen)

Zieltierart

Schwein (Mastschweine ab einem Alter von 7 Tagen).

Anwendungsgebiet

Aktive Immunisierung von Schweinen zur Reduktion der Häufigkeit und des Schweregrades von Lungenläsionen, die durch *Mycoplasma hyopneumoniae* hervorgerufen werden.

Art der Anwendung

Zur intramuskulären Injektion. Vor der Anwendung gut schütteln. Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Wartezeit

Null Tage

Besondere Warnhinweise

Eine versehentliche Selbstinjektion ist gefährlich – lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage!

Verfalldatum

Verwendbar bis: {MM-JJJJ}

Nach dem ersten Öffnen des Behältnisses innerhalb von 8 Stunden aufzubrauchen.

Besondere Lagerungshinweise

Kühl lagern und transportieren (+2°C – +8°C)

Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

Entsorgungshinweis: Siehe Gebrauchsinformation!

Nur für Tiere.

Arzneimittel außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

Zulassungsinhaber:

Intervet GesmbH

Siemenstrasse 107

A-1210 Wien

In Deutschland:

Verschreibungspflichtig

Zul.-Nr.: PEI.V.03209.01.1

In Österreich:

Rezept- und Apothekenpflichtig, NR

Zul.-Nr.: 8-20248

Ch.-B. {Nummer}

Karton**M+PAC****- Emulsion zur Injektion für Schweine -****Immunologisch wirksamer Bestandteil und sonstige Bestandteile**

Eine Impfdosis zu 1 ml enthält:

Wirksame Bestandteile:

<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> , inaktiviert	≥ 1,47 RPE (*)
---	----------------

Adjuvantien:

dünnflüssiges Mineralöl	0,134 ml
-------------------------	----------

Aluminium (als Hydroxid)	1,0 mg
--------------------------	--------

Konservierungsmittel

Thiomersal	0,10 mg
------------	---------

Sonstige Bestandteile	ad 1 ml
-----------------------	---------

(*) Relative Einheit; verglichen mit einer definierten Referenz-Vakzine

Packungsgrößen

1x 50 ml / 2x 50 ml/ 5x 50 ml/ 10x 50 ml (in Abhängigkeit vom Vakzinierungsschema 50 Dosen oder 25 Dosen)

1x 100 ml / 2x 100 ml/ 5x 100 ml/ 10x 100 ml (in Abhängigkeit vom Vakzinierungsschema 100 Dosen oder 50 Dosen)

1x 200 ml / 2x 200 ml/ 5x 200 ml/ 10x 200 ml (in Abhängigkeit vom Vakzinierungsschema 200 Dosen oder 100 Dosen)

Zieltierart

Schwein (Mastschweine ab einem Alter von 7 Tagen).

AnwendungsgebietAktive Immunisierung von Schweinen zur Reduktion der Häufigkeit und des Schweregrades von Lungenläsionen, die durch *Mycoplasma hyopneumoniae* hervorgerufen werden.**Art der Anwendung**

Zur intramuskulären Injektion. Vor der Anwendung gut schütteln. Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Wartezeit

Null Tage

Besondere Warnhinweise

Eine versehentliche Selbstinjektion ist gefährlich – lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage!

Verfalldatum

Verwendbar bis: {MM-JJJJ}

Nach dem ersten Öffnen des Behältnisses innerhalb von 8 Stunden aufzubrauchen.

Besondere Lagerungshinweise

Kühl lagern und transportieren (+2°C – +8°C)

Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

Entsorgungshinweis: Siehe Gebrauchsinformation!

Nur für Tiere.

Arzneimittel außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

Zulassungsinhaber:

Intervet GesmbH

Siemenstrasse 107

A-1210 Wien

In Deutschland:

Verschreibungspflichtig

Zul.-Nr.: PEI.V.03209.01.1

In Österreich:

Rezept- und Apothekenpflichtig, NR

Zul.-Nr.: 8-20248

Ch.-B. {Nummer}